

Simon, E. 1903. Descriptions d'arachnides nouveaux.
Ann. Soc. ent. Belg. 47: 38.

Hypsithylla linearis Simon, 1903

Hypsithylla nov. gen. — A *Vorapto* differt oculorum linea antica valde procurva, oculis mediis a lateralibus quam inter se remotioribus, lateralibus ut in *Euprosthenopi* ad marginem anticum sitis sed non prominulis. A *Thanatidio* cui sat affine est, differt oculis lateralibus anticis mediis paulo minoribus, area quatuor mediorum latiore postice quam longiore et oculorum linea postica latiore, pedibus (3^{is} exceptis) longissimis, tarsis filiformibus, ut in *Trechalea* flexuosis, tibiis metatarsisque anticis aculeis inferioribus longissimis seriatis numerosioribus, in tibiis 8-8 vel 9-9, in metatarsis 5-5 (in *Thanatidio* in tibiis 4-4 vel 5-5, in metatarsis 3-3).

H. linearis sp. nov. — ♀ (pullus). Long. 15 mill. — Cephalothorax fulvus, crebre luteo-pubescentis, utrinque antice pilis albis longioribus munitis, humilis et longus, postice quam antice longius attenuatus, parte thoracica sulco medio longo divisa, postice truncata. Oculi singulariter nigro-cincti. Abdomen (valde detritum) cylindraceum et longissimum, cinereo-testaceum. Pedes (3^{is} exceptis) longissimi, lutei, patellis, tibiis metatarsisque ad apicem rufescenti-tinctis, femoribus anticis setis spiniformibus longis biseriatis paucis subtus munitis, tibiis aculeis longissimis 9-9, metatarsis aculeis similibus 5-5, aculeisque lateralibus paulo minoribus, armatis. — Madagascar : Antongil (Mocquerys).