

Simon, E. 1885. Etudes arachnologiques. 18e Mémoire. XXVI.  
Matériaux pour servir à la faune des Arachnides du Sénégal.  
(Suivi d'une appendice intitulé: Descriptions de plusieurs espèces  
africaines nouvelles). Ann. Soc. ent. Fr. (6) 5: 389.

*HELIOPHANUS ORCHESTA*, sp. nov. — ♂. Long. 2,9 mill. — Cephalothorax niger subtiliter coriaceus, parte cephalica squamulis aeneo-micantibus, thoracica pilis fulvis dense vestitis, linea marginali exili alba cinctus. Area oculorum vix latior postice quam antice et postice cephalothorace vix angustior. Pili oculorum pauci albidi. Clypeus fere glaber.




Fig. 2. Patte-mâchoire  
du mâle de profil.

Abdomen breve, supra fulvo-aeneo pubescens antice areu albo marginatum et postice vitta transversa alba in medio interrupta ornatum, infra albo-squamulatum. Sternum nigrum parce albo-squamulatum. Chelae breves fusco nigrova aenae, transversim rugatae. Pedes breves flavi vel fulvi, femoribus infuscatis, tibiis obsolete fusco-lineatis, albo-squamulati. Pedes-maxillares fusci vel olivacei albido-squamulati, femore valde compresso infra dilatato atque apophysa ad basin latissima sed valde triangulariter attenuata simpliciter acutissima et uncata armato, patella sat longa, tibia multo breviore transversa extus ad apicem apophysa minuta gracillima recta apice depressa truncata et minutissime excisa armata, tarso longe ovato, bulbo ad basin valde convexo. — Zauzibar.

*H. cupreo* Walck. affinis differt apophysa femoralis acutissima, etc.