

Simon, E. 1902. Etudes arachnologiques. 31e Mémoire. LI.
Descriptions d'espèces nouvelles de la famille des Salticidae (suite).
Ann. Soc. ent. Fr. 71: 407.

Phaustostylus grandidieri Simon, 1902

P. Grandidieri, sp. nov. — ♂ long. 7 mill. — Cephalothorax obscure rubro-castaneus, parte cephalica infuscata et maculis latis nigris utrinque notata, supra fulvo-nitido in lateribus aurantiaco-pubescenti et vitta media nivea ornata, parte thoracica antice dilutiore et rubro-pilosa sed vitta marginali lata albo-pilosa cincta. Pili oculorum supra et inter oculos aurantiaci, subtus albi. Clypeus crebre et longe albo-barbatus. Abdomen supra pallide testaceum, utrinque linea exili flexuosa, in medio vitta latiore et aurantiaco-marginata, albo-pilosus, ornatum, subtus obscure testaceum, fere glabrum. Chelae convexae et leviter divaricatae, sed verticales, antice nigro-aeneae, pilis albis longis hirsutae, marginibus sulci sat longis et depresso, dentibus mediocribus remotis. Partes oris nigrantes, testaceo-marginatae. Pedes fulvi, femoribus, praesertim anticeis, infuscatis, tibiis metatarsisque anticis apice late infuscatis et tibiis annulo medio albo-piloso, ornatis. Pedes-maxillares longi et graciles, fulvo-rufuli, parce albo-pilosi; femore longo curvato; patella saltem duplo longiore quam latiore utrinque uniaculeata; tibia patella circiter aequilonga paulo graciliore, tereti, apophysi apicali simplici et acuta extus armata; tarso anguste ovato, tibia paulo longiore, non multo latiore; bulbo longo, ad basin attenuato breviter et obtuse producto, ad apicem stylo parvo et uncato munito.

Madagascar : St^e-Marie.