

Vinson, A. 1863. Aranéides des îles de la Réunion, Maurice et Madagascar. Paris: 262-263.

3° ULOBORE DES VANILLIERS. (*Uloborus vanillarum*,  
Vinson.)

Cet ULOBORE est la plus petite des trois espèces qu'on trouve à l'île de la Réunion.

Long. : 4<sup>mm</sup>.

La couleur uniforme est d'un fauve terreux très-sombre.

Abdomen relevé en avant, incliné en arrière, surmonté de deux tubercules latéraux sur le tiers antérieur : il est fauve noirâtre avec quelques poils d'un roux doré, et de petites taches noires au centre, au nombre de deux ou trois en long, sur l'abdomen. L'extrémité postérieure est légèrement bifide.

Le corselet est rond, de la même couleur que l'abdomen; couvert de poils fauves.

La première paire de pattes est remarquablement plus forte et plus longue que les autres : son fémoral est renflé dans le milieu, le cubital est très-fort et hérissé de poils nombreux et épais sous forme de houppes, dans son tiers inférieur; elle est de la couleur de l'abdomen et du corselet; mais l'extrémité, d'un jaune blanchâtre, est transparente et très-déliée.

Cette petite Araignée a les yeux très-noirs et luisants; la rangée postérieure est composée d'ocelles plus grosses; celles de la rangée antérieure sont plus petites. Elle fait une toile fine et lâche entre les gousses ou les feuilles des vanilliers.