

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 728.

Aschema madagascariensis (Strand, 1907)

Cupheris madagascariensis Strand n. sp.

♀. Von *Cupheris* abweichend: Augenfeld vorn kaum schmaler als hinten, die Palpen weniger verdickt, und ihr Tarsalglied nicht kürzer als das Tibialglied. Cephal. und Mand. braun, Extrem., Sternum und Maxillen gelblich. Abdomen graugelblich, an der Basis braun, an der hinteren Abdachung und den Seiten dunkelbraun gefleckt. Epigyne: eine rötlichbraune Erhöhung, die in der Mitte vorn eine winzig kleine, aber tiefe, nach hinten sich durch eine Längsfurche fortsetzende Grube und hinten zwei erheblich größere Gruben hat. — 9,3 mm. Ceph. $4,2 \times 2,5$ mm. Abd. $5,2 \times 3,5$ mm. Beine: I. 8,5; II. 6,9; III. 7, IV. 10 mm. — Var. (?) *maculifera* m. (♀ subad.). Dunkler, Cephal. mit schwarzem Rand, Extrem. mit braunen Flecken oder Ringen; Abdomen hellgraulich, aber so dicht mit violettlich schwärzlichen Flecken bestreut, daß die Grundfärbung fast verdrängt wird. — Majunga (Voeltzkow) [M. B.].