

Simon, E. 1889. Etudes arachnologiques. 21e Mémoire. XXXI. Descriptions d'espèces et des genres nouveaux de Madagascar et de Mayotte. Ann. Soc. ent. Fr. (6) 8: 231.

*Madrela angusta* (Simon, 1889)

Genus STORENOMORPHA E. Sim., Ann. Mus. civ. Gen., XX, 1884.

Nous avons d'abord pensé que ce genre singulier devait être classé dans le voisinage du genre *Oedignatha* Th., qui, à cette époque, ne nous était pas connu en nature; nous pensons aujourd'hui qu'il doit rentrer dans la famille des *Zodariidae* et y devenir le type d'une sous-famille, principalement caractérisée par l'existence de scopulas, caractère très exceptionnel dans cette famille. La troisième griffe, qui nous avait échappé, est très petite et cachée par les scopulas.

Le type du genre, *S. Camottoi* E. Sim., est propre à la Birmanie. une seconde espèce habite Madagascar :

43. STORENOMORPHA ANGUSTA, sp. nov., ♀ (pullus). — Long. 3,5 mill. — Cephalothorax lævis, nitidus, glaber, fulvo-rufescens, versus marginem et præsertim antice, in regione oculorum, sensim infuscatus. Abdomen angustum et longum, albido-testaceum, vitta media nebulosa fulvo-olivacea, in parte apicali valde ampliata et maculam ovatam albam includente, supra notatum, subtus pallide fulvo-testaceum. postice leviter infuscatum. Sternum fulvo-rufescens versus marginem infuscatum. Partes oris, chelæ, pedes-maxillares pedesque fulvo-rufuli, tarsis leviter infuscatis, rare scopulatis, sed fasciiculis unguicularibus angustis munitis, — Madagascar.