

Vinson, A. 1863. Aranéides des îles de la Réunion, Maurice et Madagascar. Paris: 100-102.

Uduba madagascariensis (Vinson, 1863)

4^e OLIOS DE MADAGASCAR. (*Olios Madagascariensis*,
Vinson.)

Long. : 18^{mm}. *Mâle*.

Aspect général. Allongé, fauve doré avec deux bandes allongées, brun fauve, sur les côtés du corselet; une bande médiane moins prononcée sur l'abdomen. Pattes plus grêles que chez l'*Olios leucosius*.

Le corselet est plus long que large, ovoïde et comprimé sur les côtés comme celui des Lycoses; la tête est proéminente, bombée, surbaissée vers les yeux, élargie sur les côtés, coupée carrément en avant. Le corselet est velu, de couleur fauve doré, avec une double bande marron foncé qui forme un fer-à-cheval ouvert du côté de la tête.

L'abdomen est petit, ovoïde, dilaté postérieurement; il est fauve doré, avec une raie brune et longitudinale au centre et qui va en se fondant sur ses bords.

Pattes très-grandes, fortes et très-allongées, très-robustes dans les deux premiers articles; très-amincies

et très-velues dans les deux derniers, le tibial et le digital.

Palpes longs, articles ovoïdes, digital énorme et cordiforme.

Le dessous du thorax et de l'abdomen est fauve clair. La première paire de pattes et la quatrième sont les plus longues.

Les yeux sont jaunes d'ambre. Les latéraux paraissent un peu plus gros que les intermédiaires et sont enchâssés sur de petites éminences qui les dirigent obliquement, les postérieurs en dehors et les antérieurs en avant.

<i>Mesures.</i> Longueur du corselet. . .	8 ^{mm} .
Longueur de l'abdomen . . .	10 ^{mm} .
Première paire de pattes. . .	36 ^{mm} 1/2.
Deuxième — . . .	37 ^{mm} 1/2.

J'ai trouvé ce grand *Olios* le soir dans ma chambre à Tananarive. Il a de grands rapports, surtout dans la couleur, avec l'*Olios leucosius* dont il paraît avoir les mœurs; mais il s'en distingue comme espèce différente par les caractères physiques énumérés ci-dessus.
— Habite Madagascar.