

Simon, E. 1906. Etude sur les araignées de la section des cribellates. Ann. Soc. ent. Belg. 50: 293.

Uduba madagascariensis (Vinson). — *Olios madagascariensis* Vinson, Aran. Réun. etc. 1864, p. 100. — ♀. Long. 20-25 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, fulvo-cervino-pubescent, vitta media lata, marginem posticum haud attingente, postice attenuata, antice evanescente, vitlaque marginali lata et dentata dilutioribus et albidius pilosis, ornatus. Oculi antici in lineam procurvam, inter se subæquales, medii a lateralibus quam inter se saltem $1/3$ remotiores. Oculi postici, superne visi, in lineam leviter procurvam, medii inter se appropinquati sed spatio oculo non multo minore separati, a lateralibus spatio oculo plus quadruplo latiore distantes. Oculi quatuor medii aream vix longiorem quam latiore et antice quam postice paulo angustiore, occupantes, antici posticis paulo majores. Abdomen superne fulvo-olivaceum, cervino-pubescent, maculis iniquis punctisque fuscis conspersum, subtus dilutius vix punctatum, regione epigasteris paulum infuscata. Chelæ validæ et convexæ, fusco-castaneæ fere nigræ, crebre et longe fulvo-hirsutæ, margine inferiore sulci dentibus trinis subæquis, margine superiore, ad angulum, dentibus binis validis, æquis et contiguis denteque ultimo multo minore, armatis. Partes oris fusco-castaneæ fere nigræ. Sternum læve, pallide fusco-rufescens. Pedes robusti, fusco-castanei, coxis femoribusque dilutioribus, tibia 3^a paris aculeis dorsalibus binis armata, tibia 4^a paris aculeis dorsalibus carente. Plaga genitalis nigra et nitida paulo longior quam latior, haud foveolata, plagula longiore quam latiore acute triquetra, antice munita. — Madagascar : Imerina.

Jusqu'ici nous ne connaissons que le mâle de cette espèce.