

УДК 595.797(574)

© 1994 г.

В. Л. Казенас

НОВЫЕ ВИДЫ ОС РОДА *OXYBELUS* LATREILLE (HYMENOPTERA, SPHECIDAE) ИЗ КАЗАХСТАНА[V. L. KAZENAS. NEW SPECIES OF WASPS OF THE GENUS *OXYBELUS* LATREILLE (HYMENOPTERA, SPHECIDAE) FROM KAZAKHSTAN]

В фауне Казахстана известно около 20 видов рода *Oxybelus*. Однако эту цифру нельзя считать окончательной. Изучение материалов, собранных автором в Казахстане, позволило выявить для его фауны несколько новых видов. Три из них описываются ниже.

Oxybelus adductus Kazenas, sp. n.

Материал. Юго-Восточный Казахстан, р. Или, 17 км сев.-зап. пос. Баканас, 18 VII 1970, 1 ♀ (Казенас) — голотип. Паратипы: там же, 25 VI 1970, 1 ♀ (Казенас); Илийск (пос. Или), 28 VI 1967, 2 ♀ (Казенас), 24 V 1968, 1 ♀ (Казенас), 13 VI 1968, 1 ♀, 2 ♂ (Казенас), 15 VI 1968, 2 ♂ (Казенас); 17 км сев.-зап. пос. Баканас, 20 VII 1970, 2 ♂, 27 VI 1970, 1 ♂ (Казенас); 35 км сев.-зап. Капчагая, 24 V 1982, 1 ♀, 1 ♂ (Казенас); там же, 21 V 1982, 1 ♀, 2 ♂ (Казенас); горы Богуты, 11 VII 1968, 1 ♀, 2 ♂, (Казенас); 10 км юго-зап. Панфилова, 3 IX 1970, 1 ♀ (Казенас); 8 км сев. Талгара, 15 VIII 1981, 1 ♀ (Казенас); р. Кокпатаз, 16 VIII 1972, 1 ♀, 2 ♂ (Казенас); Восточный Казахстан, Зайсанская котловина, 10 км сев.-вост. пос. Каратал, 3 VII 1980, 2 ♀, 9 ♂ (Казенас); 29 км вост. Каратал, 12 VII 1980, 2 ♀, 3 ♂ (Казенас); Пржевальск, 6 VII 1980, 1 ♀ (Казенас); 25 км сев. Рыбачьего, 9 VI 1980, 3 ♀ (Казенас); Урджар, 14 VI 1980, 2 ♂ (Казенас); Южный Казахстан, пустыня Муюнкум, 30 км юго-зап. г. Чу, 8 VI 1981, 1 ♂ (Казенас); пустыня Кызылкум, 8 км юго-зап. Чардары, 16, 17 V 1979, 4 ♀ (Казенас); Центральный Казахстан, г. Балхаш, 21 VI 1969, 1 ♂ (Казенас); 3 км сев. Балхаша, 30 V 1974, 1 ♂ (Казенас); пустыня Бетпакдала, 50 км сев.-зап. Фурмановки, 7 VIII 1975, 1 ♀ (Казенас); Тургайский прогиб, р. Каратургай, 10 км юго-зап. пос. Шийли, 26 VI 1977, 1 ♂ (Казенас); 25 км юго-зап. Аркалыка, 23 VI 1977, 1 ♂ (Казенас); 5 км южнее пос. Шийли, 25 VI 1977, 5 ♂ (Казенас); 10 км вост. пос. Амангельды, 28 VI 1977, 1 ♂ (Казенас), пос. Иргиз, 3 VIII 1977, 1 ♂ (Казенас); 5 км южнее Актюбинска, 24 VII 1977, 1 ♂ (Казенас); пос. Бабатай (близ Уила), 25 VII 1967, 1 ♀ (Казенас).

Самка. Наличник с большим коническим бугром посередине и маленьким бугорком посередине у переднего края. Передний край срединной лопасти наличника с 3 слабовыраженными закругленными выступами (рис. 1, Л). Передняя часть наличника более или менее гладкая, блестящая. Боковые лопасти наличника отделены от лба непунктированным голым участком выше шва. Лоб на большей части с густой, довольно мелкой пунктировкой и густым прилегающим, направленным вниз опушением. Верх лба и темя с отстоящими длинными волосками (они не короче диаметра переднего глазка), густой пунктировкой и едва заметными складками.

Переднеспинка с очень узкой полупрозрачной каймой на поперечном киле. Среднеспинка с густой и довольно крупной пунктировкой. Точки круглые или слегка продольно удлинённые, в 3—4 раза уже переднего глазка. Волоски на среднеспинке полуприлегающие, дугообразно изогнутые, по длине приблизительно равные диаметру переднего глазка. Бока среднегруди более или менее сглаженные вверху впереди (у омаулюса), с довольно редкой пунктировкой. Промежутки




Рис. 1. *Oxybelus adductus* sp. n., ♀.

1 — передняя часть срединной лопасти наличника, 2 — заднешитик и шип промежуточного сегмента, 3 — чешуя заднешитика сбоку, 4 — рисунок брюшка сверху.

между точками более или менее блестящие, с едва заметной микроскульптурой и слабо развитыми складками, особенно в задней части. Низ боков среднегруди с более густой и крупной пунктировкой и почти без складок в промежутках. Заднешитик с центральным продольным килем и большими раздвоенными чешуями. Верхняя (внутренняя) лопасть чешуй обычно длиннее и шире, чем нижняя (рис. 1, 2, 3). Шип промежуточного сегмента с почти параллельными боковыми краями (рис. 1, 2), обычно с маленькой выемкой на конце.

Тергиты брюшка впереди густо, сзади (у каймы) редко и довольно мелко пунктированные. Точки в 5—6 раз уже переднего глазка. Кайма тергитов довольно густо пунктированная, с нежными негустыми волосками (их длина меньше диаметра переднего глазка). Пигидиальное поле с густыми, крупными, неглубокими, слегка удлинненными точками. 2-й стернит посередине с редкой неглубокой и не крупной пунктировкой, по бокам с более густой пунктировкой на гладком блестящем фоне, почти без микроскульптуры.

Окраска. Жвалы беловато-желтые в базальной половине, красно-рыжие посередине, черные на вершине. 1-й членик усиков черно-бурый или рыжевато-бурый. Жгутик усиков рыжий, снизу светлее, чем сверху. Переднеспинка черная. Плечевые бугры желтовато-белые. Щитик с 2 большими, иногда почти сливающимися желтовато-белыми пятнами. Заднешитик (вместе с чешуями) желтовато-белый. Шип промежуточного сегмента с беловатой серединой, черным основанием и полупрозрачными боковыми краями и вершиной. Тегулы рыжеватые, полупрозрачные, с желтовато-белым пятном. Крыловые пластинки на большей части желтовато-белые. Жилки более или менее обесцвеченные, желтовато-рыжеватые, задние — у основания белые. Тергиты брюшка с довольно широкими, 1—3-й — с более или менее суженными (или прерванными) посередине перемычками (рис. 1, 4). Стерниты брюшка черные. Пигидий красно-рыжий (у основания часто более или менее бурый). Тазики и вертлуги бурые, отчасти рыжеватые. Передние и средние бедра изнутри более или менее рыжие, снаружи бурые или черные, с желтовато-белым пятном у вершины. Задние бедра почти целиком рыжие. Голени рыжие, передние и средние (иногда и задние) — с желтовато-белой полосой (пятном) снаружи. Лапки рыжие, передние отчасти (иногда и средние) желтовато-белые. Последний членик лапок более или менее желтовато-белый у вершины снаружи.

Длина тела 5.8—7.4 мм.

Самец. Наличник с высоким килеобразным бугром посередине, отделенным впереди от срединного зубца переднего края маленькой выемкой (см. в профиль — рис. 2, 2). Срединный зубец наличника двойной (нижний край его переходит в маленький зубец на краю передней каймы). Боковые зубцы наличника на вершине широкие, тупые, усеченные (рис. 2, 1). Боковые лопасти наличника отделены от лба, кроме швов, узкими голыми и блестящими площадками. Лоб густо пунктированный, со светлыми прилегающими, направленными вниз волосками (в верхней части лба волоски отстоящие). Наиболее длинные из отстоящих волосков не короче




Рис. 2. *Oxybelus adductus* sp. n., ♂.

1 — средняя часть налечника спереди, 2 — срединный киль налечника сбоку, 3 — заднешитик и шип промежуточного сегмента, 4 — чешуя заднешитика сбоку, 5 — рисунок брюшка сверху.

диаметра переднего глазка. Верх лба и темя густо пунктированные, слегка морщинистые, с нечеткой микроскульптурой в промежутках между точками.

Верх переднеспинки с узкой острой поперечной полупрозрачной буровой каймой (килем). Среднеспинка с густой крупной пунктировкой. Промежутки между точками имеют тенденцию к образованию складок. Точки в 2.5—3 раза уже переднего глазка. Волоски среднеспинки немного короче диаметра переднего глазка, изогнутые, полуприлегающие. Бока среднегруди грубо-, отчасти ячейисто-складчатые и нечетко крупно пунктированные, впереди у омаулюса более или менее сглаженные. Щитик с центральным продольным килем и грубой густой пунктировкой. Заднешитик с единственным срединным продольным килем. Чешуи заднешитика раздвоенные, с широкой и тупой верхней (рис. 2, 3, 4) и острой узкой нижней лопастями. Шип промежуточного сегмента широкий, с маленькой вырезкой сзади (рис. 2, 3). Его ширина приблизительно равна ширине промежутка между основаниями чешуй сзади, наименьшая ширина равна диаметру переднего глазка. Длина шипа в среднем в 2.5 раза больше его наибольшей ширины и примерно в 1.2 раза больше длины щитика посередине.

Тергиты брюшка с густой пунктировкой. Точка на 2-м тергите в среднем в 4 раза уже переднего глазка. 3—6-й тергиты по бокам с хорошо заметным зубцом. 2-й стернит посередине с довольно редкой пунктировкой. Стерниты брюшка перед задним краем с гладкой блестящей выпуклой зоной.

Окраска. Жвалы в базальной половине желтые или рыжевато-желтые, иногда отчасти у основания бурые, посередине рыжевато-желтые, на вершине черные. Скапус черно-бурый. Жгутик усиков рыжий или беловато-рыжий, более светлый на вершине и изнутри. Переднеспинка черная, только плечевые бугры обычно желтовато-белые. Тегулы светлые, с желтовато-белым пятном у основания. Щитик обычно с желтовато-белыми боковыми пятнами. Заднешитик отчасти желтовато-белый. Чешуи заднешитика желтовато-белые на основании, с полупрозрачными желтоватыми широкими краями. Шип промежуточного сегмента в задней половине посередине желтовато-белый, с полупрозрачными рыжевато-желтыми краями. 1-й тергит брюшка с большими беловато-желтыми или желтовато-белыми боковыми пятнами (рис. 2, 5). Пигидий черный. Бедрa черные, слегка рыжевато-желтые изнутри на вершине. Голенн более или менее рыжие, с желтыми полосками (пятнами) на наружной поверхности. Лапки рыжие.

Длина тела в среднем 6 мм.

От других видов *O. adductus* sp. n. четко отличается окраской и скульптурой тергитов брюшка, особым сочетанием других таксономических морфологических признаков (наличие боковых голых участков на границе лба и

наличника, редкая нечеткая пунктировка мезоплевр в передней верхней части, раздвоенные чешуи заднещитика, почти параллельные боковые края шипа промежуточного сегмента), особой совокупностью деталей окраски (желто-белые в базальной части и красные посередине жвалы, бурый или рыжий скапус, черная переднеспинка, 2 беловатых пятна на щитике, светлый заднещитик, желтовато-белое пятно на шипе промежуточного сегмента, рыжий пигидий самки, рыжие голени и лапки, рыжие задние бедра самки и др.).

Oxybelus amoenus Kazenas, sp. n.

Материал. Юго-Восточный Казахстан, р. Или, пос. Или, 25 V 1968, 1 ♀ (Казенас) — голотип. Паратипы: там же, 29 V 1968, 1 ♀ (Казенас), 24 V 1968, 1 ♀, 3 ♂ (Казенас); 8 км южн. пос. Или, 31 V 1968, 1 ♀, 1 ♂ (Казенас); 35 км сев.-зап. Капчагая, 23 V 1982, 2 ♀, 1 ♂ (Казенас); там же, 24 V 1982, 3 ♀, 4 ♂ (Казенас); там же, 19 V 1982, 2 ♀, 1 ♂ (Казенас); там же, 21 V 1982, 9 ♂ (Казенас), 16 км вост. Аяк-Калкана, 5 VI 1971, 1 ♀, 1 ♂ (Казенас); 18 км сев.-вост. Аяк-Калкана, 2 VI 1971, 2 ♀ (Казенас); 15 км вост. Аяк-Калкана, 7 VI 1971, 1 ♀ (Казенас); там же, 17 VI 1971, 1 ♂ (Казенас); 20 км сев.-вост. Аяк-Калкана, 8 VI 1971, 2 ♂ (Казенас); 17 км сев.-зап. Баканаса, 27 VI 1970, 1 ♀; там же, 20 VII 1970, 2 ♂; там же, 1 VII 1970, 2 ♂; там же, 2 VII 1970, 1 ♂; там же, 7 VII 1970, 1 ♂ (Казенас); р. Чилик, Бартогай, 8 VI 1968, 1 ♂ (Казенас).

Самка. Наличник между боковыми зубцами равномерно дугобразно закругленный (рис. 3, 1) или почти прямой. Срединный бугор наличника маленький, острый на вершине. Лоб с густой пунктировкой и светлыми прилегающими волосками. Верхняя граница направленных вниз прилегающих волосков проходит впереди переднего глазка на расстоянии, примерно равном 1—1.5 диаметра переднего глазка. Верх лба и темя с волосками, по длине равными диаметру переднего глазка или немного превышающими его.

Переднеспинка с узкой поперечной полупрозрачной каймой (килем). Среднеспинка с густой, не очень крупной пунктировкой. Точки в среднем в 4 раза уже переднего глазка. Волоски среднеспинки короче диаметра переднего глазка, дугобразно изогнутые, полуприлегающие, желтовато-серые. Бока среднегруди с густой пунктировкой и местами с неправильными складками. Щитик с такой же пунктировкой, как среднеспинка. Заднещитик с небольшим центральным продольным килем. Чешуи заднещитика слабо раздвоенные (рис. 3, 2, 3). Шип промежуточного сегмента приблизительно в 3 раза длиннее своей наименьшей ширины, на конце более или менее закругленный, слегка расширяющийся кзади или с почти параллельными сторонами (рис. 3, 2), приблизительно равен по длине щитику посередине.

Тергиты брюшка с мелкой густой пунктировкой. Точки в 5—7 раз уже переднего глазка. Тергиты с очень густо пунктированной и коротко опушенной, слегка вдавленной каймой сзади. Пигидиальное поле с крупными густыми, продольно удлинненными точками и короткими полуприлегающими волосками. 2-й стернит посередине с крупными редкими (по бокам с более мелкими и густыми) точками.

Окраска. Жвалы посередине желтовато-бурые (часто со светло-желтым пятном), на вершине и у основания буровато-черные. Скапус буровато-черный, у вершины рыжеватый. Жгутик усиков светло-рыжий, буроватый у основания. Верх переднеспинки с поперечной светло-желтой полосой или с боковыми светло-желтыми пятнами, иногда черный. Плечевые бугры беловато-желтые. Тегулы и пластинка у основания передних крыльев светлые, рыжеватые, полупрозрачные, со светло-желтыми пятнами. Чешуи заднещитика светлые, у основания беловато-желтые. Щитик иногда с боковыми светло-желтыми пятнами, а заднещитик целиком светло-желтый. Шип промежуточного сегмента черный, иногда со светло-желтым пятном. 1—4-й (иногда и 5-й) тергиты брюшка с узкими, прерванными или суженными посередине светло-желтыми перевязями (рис. 3, 4). 5-й тергит обычно сзади более или менее рыжий. Пигидий рыжевато-красный, со светло-рыжими волосками. Стерниты брюшка черно-бурые, отчасти рыжеватые. Бедра черно-бурые, отчасти (в вершинной части) рыжие (изнутри). Голени и лапки рыжие. Остальная поверхность тела и ног черная. Голени обычно у основания на наружной поверхности с маленькими светло-желтыми пятнами. Передние и средние бедра у наиболее светлоокрашенных экземпляров снизу у основания со светло-желтым пятном. Иногда и задние тазики имеют светло-желтые пятна. Имеются экземпляры, почти лишенные светло-желтого рисунка.

Длина тела 5.8—7.8 мм (у голотипа 6.8 мм).




Рис. 3. *Oxybelus amoenus* sp. n.

1 — передний край срединной лопасти наличника ♀, 2 — заднещитик и шип промежуточного сегмента ♀ сверху, 3 — чешуя заднещитика ♀, 4 — рисунок брюшка ♀ сверху, 5 — средняя часть наличника ♂, 6 — срединный киль наличника ♂ сбоку, 7 — заднещитик и шип промежуточного сегмента ♂ сверху, 8 — чешуя заднещитика ♂ сбоку.

Самец. Наличник с широким притупленным килем посередине, переходящим впереди в зубец (рис. 3, 5). Срединный зубец наличника простой (рис. 3, 6). Боковые зубцы на вершине притупленные. Наличник в верхней части по бокам от срединного киля с гладкими и блестящими участками (впереди от усиковых ямок). Лоб с густой пунктировкой (промежутки между точками уже точек, гладкие и блестящие) и светлым опушением (волоски более или менее прилегающие, на большей части лба направлены вниз). Темя с более крупной, чем на лбу, густой пунктировкой.

Переднеспинка с узкой поперечной полупрозрачной каймой, слегка выемчатой посередине. Среднеспинка с густой, довольно крупной пунктировкой. Точки в 3.5—4 раза уже переднего глазка. Волоски на среднеспинке негустые, прямые, полуприлегающие, светло-серые. Промежутки между точками уже точек, гладкие и блестящие. Бока среднегруды густо пунктированные, с неправильной ячеисто-складчатой скульптурой. Щитик с пунктировкой, как на среднеспинке. Заднещитик с центральным довольно высоким продольным килем. Чешуи заднещитика раздвоенные (рис. 3, 7, 8). Шип промежуточного сегмента (рис. 3, 7) более или менее полупрозрачный по краям, желобообразный, в 3—4 раза длиннее диаметра переднего глазка и в 1.1—1.3 раза длиннее щитика посередине, с параллельными или слегка расходящимися к вершине боковыми краями.

Тергиты брюшка с густой не крупной пунктировкой. Точки в 4—5 раз уже переднего глазка. 1—5-й тергиты с очень густо пунктированной и покрытой довольно длинными густыми серебристыми волосками каймой, ширина которой на 2-м тергите приблизительно равна диаметру переднего глазка. 3—6-й тергиты без боковых зубцов. Стерниты брюшка с крупной редкой (по бокам и у основания густой) пунктировкой.

Окраска. Тело на большей части черное. Жвалы рыжевато-желтые, с красно-бурой вершиной и бурым основанием. Скапус бурый. Жгутик спереди бурый, сзади более или менее рыжий. Переднеспинка со светлыми пятнами, плечевые бугры и крыловые крышечки светлые (тегулы отчасти рыжеватые). Чешуи заднещитика с желтовато-белым основанием. Шип промежуточного сегмента бурый, часто сзади посередине желтовато-белый (иногда светло-рыжий), по краям и на вершине полупрозрачный, рыжеватый. 1—5-й тергиты (иногда только 1—4-й или 1—3-й) с прерванной или выемчатой посередине перевязью. Бедра черные, обычно только на вершине рыжеватые, передние и иногда средние с маленьким желтовато-белым пятнышком. Передние голени (обычно и средние) рыжие, со светло-желтой полосой на наружной поверхности. Задние голени (иногда и средние) бурые, отчасти рыжие, со светло-желтым пятном у основания снаружи (иногда и у вершины). Лапки рыжие, отчасти буроватые. Крылья прозрачные, с желтоватым оттенком, жилки светло-коричневые, у основания крыльев рыжеватые.

Длина тела 5.0—6.5 мм.




Рис. 4. *Oxybelus tshardarensis* sp. n.

1 — наличник ♀, 2 — заднешитик и шип промежуточного сегмента ♀, 3 — чешуйка заднешитика ♀ сбоку, 4 — рисунок брюшка ♀, 5 — передний край срединной лопасти наличника ♂ спереди, 6 — срединный зубец наличника ♂ сбоку.

Вид отличается от других близких видов совокупностью следующих признаков: чешуи заднешитика раздвоенные, срединный зубец наличника самца простой, бедра (по крайней мере, задние) у самки отчасти рыжие, голени и лапки целиком рыжие, пигидий и задний край 5-го тергита брюшка рыжие, боковые части дорсальной поверхности промежуточного сегмента с густым опушением, кайма тергитов широкая, покрытая густой пунктировкой и серебристым опушением; перевязи тергитов узкие и обычно прерванные; передний край наличника (между боковыми зубцами) дугообразно изогнутый.

Oxybelus tshardarensis Kazenas, sp. n.

Материал. Южный Казахстан, Чардаринское водохранилище, 8 км юго-зап. Чардары, 16 V 1979, 1 ♀ (Казенас) — голотип. Паратипы: там же и 10 км юго-зап. Чардары, 11—17 V 1979, 43 ♀, 69 ♂ (Казенас).

Самка. Передний край наличника широко дугообразно (или лопастевидно) выступающий между боковыми зубцами (рис. 4, 1). Срединный бугор острый, низкий. Наличник без боковых гладких участков. Опушение его густое, обычное. Граница изменения направления волосков на лбу расположена ниже переднего глазка на расстоянии, равном 1—1.2 диаметра переднего глазка. Промежуток между задними глазками примерно в 3 раза шире промежутка между одним из них и ближайшим глазом. Среднеспинка с густой, не очень крупной пунктировкой. Бока среднегруди с крупными густыми точками, у омаулюса более или менее сглаженные в промежутках между точками, на остальной поверхности шероховатые. Заднешитик со срединным килем и неправильно изогнутыми боковыми киями. Чешуйки слабо раздвоенные (рис. 4, 2, 3). Шип промежуточного сегмента широкий, без выемки на конце (рис. 4, 2) или со слабой выемкой. Тергиты брюшка с густой мелкой пунктировкой. Кайма тергитов сильно вдавленная, очень густо пунктированная и опушенная. 2-й стернит брюшка посередине с редкой пунктировкой.

Мандибулы в средней части желтовато-светло-коричневые, отчасти рыжеватые. Наличник впереди слегка красновато-бурый. Скапус на вершине и на основании отчасти буровато-рыжий. Жгутик рыжий, у основания бурый. Плечевые бугры желтовато-белые или черные. Чешуйки заднешитика со светлыми пятнами на основании сзади. Шип промежуточного сегмента с буроватыми краями. 3—4 (реже 1—2) базальных тергита с узкими боковыми светло-желтыми пятнами (рис. 4, 4) или без них. Пигидий темно-рыжий или красно-рыжий (иногда отчасти бурый). Бедра в вершинной части более или менее рыжие. Голени и лапки рыжие. Крылья слегка рыжеватобуроватые. Жилки буровато-рыжие или рыжие. Тегулы и аксиллярные пластинки черно-бурые, со

светлыми краями. Голени иногда у основания снаружи с маленьким светло-желтым пятном. Длина тела 5.6—7.7 мм.

Самец. Наличник с притупленным срединным килем, без гладких боковых участков. Срединный зубец наличника простой, уже боковых (рис. 4, 5, 6). Опушение густое, но обычное. Среднеспинка с густой не очень крупной пунктировкой. Бока среднегруди с густой ячеисто-складчатой скульптурой, не сглаженные у омаулюса. Заднешитик со срединным продольным килем (иногда и с изогнутыми боковыми киями). Чешуйки заднешитика раздвоенные. Шип промежуточного сегмента слегка расширенный сзади. Тергиты брюшка с густой не очень крупной пунктировкой. 3—6-й тергиты без боковых зубцов, 6-й — без килей. 2-й стернит с крупной редкой пунктировкой посередине. Кайма тергитов, как у самки.

Мандибулы рыжевато-светло-коричневые, часто с небольшим светло-желтым пятном. Окраска тела, как у самки. Шип промежуточного сегмента иногда с беловатым пятном. Бедрa на вершине рыжеватые. Передние голени рыжие, у основания со светло-желтым пятном. Задние голени черные или бурые, у основания со светло-желтым пятном, на вершине рыжеватые. Лапки рыжие, средние и задние более или менее буроватые. Пигидий рыжий (по крайней мере, в апикальной части). Брюшко с 1—5 узкими, прерванными посередине перевязями. Переднеспинка иногда со светлыми пятнами. Длина тела 4.9—7.2 мм.

От других видов *O. tshardarensis* sp. n. отличается общей совокупностью таксономических признаков, важнейшие из которых следующие: передний край наличника самки без зубца посередине, пунктировка тела относительно мелкая (особенно у ♀), чешуйки заднешитика слабо раздвоенные, шип промежуточного сегмента широкий и довольно короткий, тергиты брюшка с густой мелкой пунктировкой, с сильно вдавленной, очень густо пунктированной и опушенной каймой, жвалы на большей части светло-коричневые (рыжеватые), заднешитик лишь со светлым пятном на основании верхних лопастей чешуек, ноги самки на большей части рыжие, базальные тергиты, как правило, с узкой прерванной перевязью, срединный зубец наличника самца простой. Вид морфологически наиболее близок к *O. atoenus*, отличается от него деталями окраски и скульптуры тела.

Голотипы всех новых видов и часть паратипов хранятся в Зоологическом институте РАН в Санкт-Петербурге, часть паратипов — в Институте зоологии Национальной Академии наук Республики Казахстан в Алма-Ате.

Институт зоологии
Национальной Академии наук
Республики Казахстан,
Алма-Ата.

Поступила 8 IV 1991.