

Simon, E. 1901. *Filstata grandidieri*, sp. nov., araignée cavernicole de Madagascar. Bull. Mus. hist. nat. Paris 7: 67.

*Andoharano grandidieri* (Simon, 1901)

**Filstata Grandidieri** sp. nov.

♀ Long., 3 millim. 5.

Pallide lutea subpellucens, area oculorum in medio transversim nigra, abdomine cinereo, longe sed parce albido-piloso, pedum-maxillarium tarso rufulotincto. Cephalothorax breviter ovatus, laevis, parcissime pilosus, regione oculari leviter elevata setos albidis erectis et obtusis ornata. Oculi aream fere duplo latioram quam longiorem occupantes, quatuor antici a sese contigui, in lineam valde procurvam, medii, nigri et rotundi, lateralibus, abbis et late ovatis, saltem duplo minores. Oculi postici ovati, utrinque contigui inter se subæquales sed lateribus anticis paulo minores. Clypeus valde proclivis; attenuatus atque obtusus, area oculorum latior. Abdomen oblongum, postice rotundum. Pedes tenues et longi, omnino mutici. Pedes-maxillares crussi, femore setis longis, parum regulariter biseriatis, subtus munito, tibia subtus crebre sed inordinate pilosa, tarso leviter ovato. Calamistrum breve biseriatum, serie superiore inferiore crassiore.

♂ Long., 3 millim. 5.

A femina differt pedibus, praesertim anticus, tenuibus et longissimis fere *Pholci*, fibiis si paris aculeorum paribus trinis, 1<sup>er</sup> mediana; reliquis in parte apicali sitis, armatis metatarsis si paris aculeo setiformi subbarilari munitis, reliquis articulis muticis. Pedes-maxillares modice longi; femore leviter curvato; patella parva; tibia patella plus duplo longiore, cylindracea, apicem versus sensim et vix ampliata et apice longe pilora; tarso parvo nodiformi; bulbo fusco-rufulo, angusto, longe attenuato atque acuto. — In spelunca *Sarandrano* dicta (G. Grandidier).