

Simon, E. 1889. Etudes arachnologiques. 21e Mémoire. XXXI.  
Descriptions d'espèces et the genres nouveaux de Madagascar et  
de Mayotte. Ann. Soc. ent. Fr. (6) 8: 228.

Genus THYREOBÆUS, nov. gen.

*Araneo* E. Simon affinis. Oculi postici parum et fere æque distantes, in linea leviter procurva. Oculi antici in linea valde recurva, medii minores, a lateralibus quam inter se remotiores. Area mediorum trapeziformis, multo longior quam latior. Pedes sat longi, breviter pilosi, aculeis tibiarum haud distinctis, metatarsis tarsisque gracilibus et longis, metatarsis tibialis haud brevioribus, tarsis metatarsis brevioribus, Abdomen valde scutatum. Sternum postice latissime truncatum et coxae postice transversim late distantes.

8. *THYREOBÆUS SCUTIGER*, sp. nov., ♀. — Long. 4,6 mill. — Cephalothorax ovatus, levigatus, fulvo-aurantiacus, linea marginali et, in parte cephalica, linea longitudinali infuscatis notatus. Area oculorum nigra. Abdomen late ovatum, albo-testaceum, mamillis nigro-cinctis, scuto dorsali late ovato, tertiam partem posteriorem attingente, fulvo-aurantiacum valde et dense rugoso, subtus regione epigasteris et scuto parvo praemamillari rufulis et coriacis. Sternum fulvo-aurantiacum valde coriaceum. Pedes luridi, apice femorum, patellis tibiisque fusco-olivaceis. Area vulvae nigra, utrinque fovea angusta et obliqua atque in medio placula parva triquetra et fulva notata. — Madagascar.