

Vinson, A. 1863. Aranéides des îles de la Réunion, Maurice et Madagascar. Paris: 87-88, 304.

PHILODROME BLANC. (*Philodromus niveus*, VINSON.)

Long. : 4 à 5<sup>mm</sup>. — *Femelle*.

*Aspect général.* Corselet blanc. Abdomen globuleux et blanc; de forme pentagonale. Pattes fines.

Le corselet est aplati et large : il est d'un blanc très-brillant.

Les yeux sont noirs ou fauve jaunâtre, placés sur deux lignes. Vus de face au microscope, le plus externe de la ligne postérieure correspond à l'œil intermédiaire de la ligne antérieure : ils sont réunis par un sillon inégal. Les yeux externes des deux lignes sont dirigés et regardent en dehors.

L'abdomen est large, de forme pentagonale et d'un blanc de lait ou de neige très-pur; il est globuleux, quoique légèrement aplati à sa surface. Lorsqu'on l'examine à la loupe, il est strié et présente l'effet le plus joli.

Les pattes sont fines et blanches : les palpes ont la même couleur.

Cette petite Aranéide est commune dans les jardins des environs de Tananarive; elle est d'un fort petit volume et se tient parmi les feuilles, où on la remarque toujours à cause de sa blancheur qui est entière. Je l'ai fréquemment vue dans les feuilles du gouyavier ou de l'oranger, à Ambouitsirouit, maison de campagne de M. Laborde, consul de France, à Tananarive. Lorsqu'on la touche elle fuit avec rapidité et se laisse tomber en demeurant suspendue à son fil.

25. **PHILODROMUS NIVEUS**, *Vins*. Cephalothorace albo; oculis nigris seu rubro-fuscis in duobus ordinibus dispositis.

Abdomine transversè extenso et niveo splendenti, globuloso et striato; pedibus tenuissimis et albis.

Habit. — *Malagascar* (Imerinà in provinciâ).