

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 736.

*Damastes majungensis* Strand n. sp.

♂. Cephal. und Extrem. rötlich, Abdomen graugelblich, unten ein wenig heller mit zwei parallelen Längslinien. Behaarung gelblichweiß. Alle Tibien unten 2, 2, 2, vorn und hinten je 1, 1, I—III oben 1 Stachel. Alle Metat. unten 2, 2, vorn und hinten an der Basis je 1, III—IV außerdem vorn mitten 1 Stachel. Vordere Augenreihe leicht procurva; die M.-A. ein wenig größer, unter sich um reichlich den Radius, von den S.-A. um den Durchmesser, vom Clypeusrande um kaum den halben Radius entfernt. Tibialglied so lang als das Patellarglied, außen mitten mit einem kurz vogelschnabelförmigen, nach außen, vorn und unten gerichteten Fortsatz. Am Ende des Bulbus zwei schmale, dornenförmige, nach vorn und innen gerichtete, parallele Fortsätze. — 10 mm. Cephal.  $4,3 \times 4,6$  mm. Abd.  $5,3 \times 4,3$  mm. Beine: I. 20,9; II. 27,7; III. 18,1; IV. 16,5 mm. — Majunga (Voeltzkow) [M. B.].