

Fage, L. 1926. Sur quelques araignées de Madagascar, nouvelles ou peu connues et sur leur curieuse industrie.

Arch. zool. expér. gen. 65: 7-8.

*Olios erraticus* nov. sp.

♀. — Coloration du céphalothorax fauve, à peine rembruni dans la région oculaire et sur le bandeau ; pièces buccales, chélicères brun-rougeâtre, celles-ci noires seulement au sommet ; sternum et pattes fauves avec les métatarses et les tarsi légèrement rembrunis ; abdomen gris, maculé de brun ; pubescence du corps et des pattes blanche. — Céphalothorax comme dans l'espèce précédente. — Yeux antérieurs en ligne droite, équidistants, les médians à peine plus gros que les latéraux, séparés par un intervalle égal au diamètre de ceux-ci ; yeux postérieurs en ligne droite, égaux, équidistants, séparés par un intervalle égal à deux fois et demie leur diamètre. Yeux médians, vus en dessus, formant un rectangle à peine plus large que long, les antérieurs nettement plus gros que les postérieurs. — Bandeau vertical, plus court que le diamètre des yeux médians antérieurs. — Marge inférieure des chélicères armées de trois grosses dents contiguës et d'une quatrième beaucoup plus petite. — Pattes comme chez *Olios cænobita*. — Epigyne (fig. 2, a) en plaque concave, gris-noirâtre, plus longue que



FIG. 2. *Olios erraticus*; a, épigyne; b, patte-m du ♂; c, apophyse tibiale vue en-dessus.

large, creusée en arrière d'une fossette, profonde, transverse, limitée antérieurement par un rebord noir récurvé, ni déprimé, ni échancré.

Longueur du corps : 14 mm. ; longueur des céphalothorax : 5 mm. ; tibia I : 6 mm.

♂. — Même coloration, même disposition des yeux, mais les antérieurs plus rapprochés. — Patte-mâchoire fauve avec l'apophyse tibiale le tarse et le bulbe rembrunis. Apophyse tibiale (fig. 2, *b* et *c*) courte et épaisse à la base, brusquement recourbée en crochet au sommet. Tarse nettement plus long que patella + tibia. Apophyse perpendiculaire de la base du style très peu saillante de profil.

Longueur du corps : 12 mm. ; longueur du céphalothorax : 4 mm. ; tibia I : 5 mm.

Habitat : 8 ♀, 2 ♂ de Tamatave, donnés au Muséum, par M. Waterlot.

Ainsi qu'on le voit, cette espèce se distingue principalement de la précédente par la disposition légèrement différente de ses yeux et surtout par ses caractères sexuels qui rappellent ceux de l'*Olios pacifer* de LESERT (1921) du Kilimandjaro.