

Vinson, A. 1863. Aranéides des îles de la Réunion, Maurice et Madagascar. Paris: 93-94, 304.

*Olios lamarcki* (Latreille, 1806)

1<sup>o</sup> OLIOS CAPTIEUX. (*Olios captiosus*, Walckenaer.)

(Pl. II, fig. 1.)

Long. : 21<sup>mm</sup>.

Araignée grande, velue. — Corselet presque en cœur, recouvert d'un duvet blanc grisâtre. L'abdomen est petit, globuleux, déprimé sur les côtés vers sa base. Sa face supérieure est d'un fauve orange ou chamois, recouverte de poils cotonneux, fins, présentant dans le milieu une gouttière ou raie longitudinale ouverte qui se termine postérieurement par une ligne noire et bien nette. Les côtés de cette gouttière, en avant, sont marqués d'une tache noire et d'une autre tache jaunâtre continue à la première, et quelques autres taches moins sensibles situées plus en arrière et moins apparentes. Pattes très-grandes, d'un gris blanchâtre, recouvertes d'un duvet cotonneux. Plusieurs taches noires en dessous : la première, sous la base de la première phalange; la deuxième, sous la seconde articulation; la troisième, sous la troisième articulation. La face inférieure du dernier article et de son digital est d'un noir terne. Palpes noirs. La poitrine est d'un beau noir de velours entre l'insertion des pattes.


Le ventre est de couleur chamois rosé avec une bande longitudinale d'un noir velouté. Au côté externe de chaque mandibule un petit écusson triangulaire, à pointe renversée, d'un rouge vif.

Cette Aranéide, telle que je l'ai peinte et décrite, a été trouvée dans une feuille de Badamier (*Terminalia catalpa*) déjà jaunie. Elle en avait réuni les bords et avait placé son cocon au centre parmi quelques fils grossiers. Ce cocon est plane d'un côté et conique de l'autre : il a le diamètre d'une pièce de 25 centimes. — J.-B. Dumont a décrit cette Araignée dans son manuscrit, sous le nom d'*Araignée-Crabe*. Je lui ai emprunté quelques passages de cette description. Ce naturaliste dit avoir trouvé une Araignée de cette espèce cachée entre trois ou quatre gousses de Brésillet qu'elle avait réunies par le moyen de quelques fils de soie très-blanche. L'Araignée se tenait au milieu de cette espèce de nid avec son cocon de forme sphérique, inégal et vilieux à sa surface, d'un blanc de neige : il adhérait à l'enveloppe extérieure par quelques fils (1).

La même espèce est ainsi décrite par Walckenaer : « Long. de 9 lignes. Abdomen ovale, fauve orangé, avec deux taches noires souvent réunies en une seule, proche le corselet; et une raie longitudinale dans le milieu du

dos, légèrement dentée, étroite et diminuant de largeur à sa partie postérieure. Ventre d'un noir velouté dans le milieu, fauve orangé sur les côtés. Mâchoires et lèvres brunes à leur base, fauves ou rouges à leur extrémité. Pattes fortes avec le métatarse et le tarse légèrement dilatés, ainsi que le digital des palpes. Cuisse renflées, palpes velus. — De l'île de France. Selon Catoire de Bioncourt, cette espèce habite dans les bois et se cache dans les troncs pourris des gros arbres (2). »

Habite les îles de la Réunion et Maurice.



26. **OLIOS CAPTIOSUS**, Walck. Cephalothorace cordis speciem representante, lanuginem gerente cinereo-albam. Abdomine globoso rupicapraeo colore distincto, eum pilis lanatis, antè insignito duobus nigris maculis inter se junctis, et duobus aliis maculis subflavis priores subsequentibus. Subtus, pectus nigrore pulcherrimo nitet, et venter rosco-rupicapraeus est, eum fasciâ nigerrimâ in longitudinem directâ.

Habit. — Réunion, Maurice (Mauritius).

(1) J.-B. DEMONT. *Manuscrit.*

(2) WALCKENAER. *Hist. des Ins. Aptères*, t. I, page 565.