

Strand, E. 1907. Vorläufige Diagnosen afrikanischer und südamerikanischer Spinnen. Zool. Anz. 31: 557-558.

Olios nossibensis Strand n. sp.

♀. Cephal. und Extrem. hell rötlich braungelb, Mand. schwarz, Sternum und Coxen hellgelb. Abdomen graugelblich, oben mit vier dunkelbraunen Punkteflecken, Seiten und Bauch dicht mit dunkelbraunen Punkten bestreut. Epigyne: sehr groß ($2,5 \times 5,1$ mm), etwa flaschenförmig, hinten erweitert, der ganzen Länge nach mit einer tiefen, an beiden Enden sich erweiternden Längsfurche, die von einem schmalen Längskiel geteilt wird. Tibien I—II unten 2, 2, 2, 2, III—IV unten 2, 2, 2, vorn und hinten je 1, 1, Met. I—II unten 2, 2, vorn und hinten an der Basis je 1, III—IV unten 2, 2, vorn und hinten je 1, 1, jedenfalls IV an der Spitze vorn 2 kleinere Stacheln. — Vordere Augenreihe gerade; die M.-A. ein wenig größer, unter sich um $\frac{2}{3}$, von den S.-A. um $\frac{1}{2}$ Durchmesser entfernt; letztere vom Clypeusrande um nicht ganz ihren Durchmesser, von den hinteren S.-A. um denselben entfernt. Hintere Reihe fast gerade; die M.-A., die kleinsten aller Augen, unter sich und von den S.-A. gleich weit entfernt. — 24 mm. Cephal. $9,5 \times 9$ mm. Abd. 12×8 mm. Beine: I. 40,2; II. 43,3; III. 32,8; IV. 35 mm. — Nossibé (Typel), Fort Dauphin (Mad.) (Vorkamp) [M. L.].