

Simon, E. 1880. Révision de la famille des Sparassidae (Arachnides). Act. Soc. linn. Bord. 34: 305.

Olios pusillus Simon, 1880

25. *O. pusillus* sp. nov.

♀) Céph.th., long. 3,7; larg. 3,6. — Abd., long. 4,5; larg. 3,3.
— Pattes: 1^{re} paire 16,7; 2^e paire 18,2; 3^e paire 12,5; 4^e paire 14,5.

Céphalothorax fauve rougeâtre testacé à pubescence blanchâtre assez longue, mêlée de crins en avant; large, très convexe, fortement incliné en arrière et un peu en avant, à front très large; strie thoracique assez courte et fine, très reculée sur la pente postérieure. — Yeux antérieurs en ligne droite, les médians au moins d'un tiers plus gros, presque équidistants, leurs intervalles à peine plus étroits que le diamètre des médians. Yeux supérieurs en ligne droite, plus petits que les antérieurs, presque égaux, presque équidistants, leurs intervalles plus que doubles de leur diamètre. Yeux latéraux non soulevés. Yeux médians formant un trapèze aussi large que long et à peine plus étroit en avant. — Bandeau un peu plus étroit que les yeux antérieurs. — Chélicères brun-rouge, très robustes et convexes, garnies de crins fauves et noirs inégaux, espacés. — Plastron fauve, légèrement ponctué de brun. Pièces buccales brunâtres avec le bord interne testacé: — Abdomen fauve clair à pubescence longue blanchâtre, marqué en dessus de quelques points bruns irréguliers. — Pattes assez longues, assez robustes, fauve rougeâtre testacé, à pubescence fauve, longue et mêlée de crins. Tibia IV de même longueur que le céphalothorax, sans épines dorsales. Fémur I pourvu sur la face antérieure d'une ligne de trois épines dont la basilaire plus courte et de deux longues épines dorsales. Scopulas longues et assez serrées aux tarses et métatarses des quatre paires. — Épigyne présentant, près le pli épigastrique, une profonde fossette semi-circulaire, un peu plus large que longue, limitée en avant par un épais rebord noir convexe et arqué.

Madagascar (Muséum. rapporté par M. Grandidier).