

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 737-738.

Palystes convexus Strand n. sp.

♀ subad. Von der typischen Art der Gattung (*P. castaneus*) (Latr.) u. a. durch stärker gewölbten Cephal., kürzere und seichtere Mittelritze, sowie kleine Unterschiede in der Augenstellung abweichend. — Cephal. und Extrem. bräunlichgelb, weißlichgelb behaart; Abd. olivengraubräunlich, silberig glänzend, messingglänzend behaart, mit schmal braun begrenztem, innen hellem Längsstreif, sowie dicht mit kleinen, länglichrunden, braunen Punkteflecken bestreut. Bauch mit kastanienbraunem Längsfeld. Hintere Augenreihe schwach recurva, die M.-A. ein wenig kleiner und kaum weiter von den S.-A. als unter sich entfernt. Vordere Reihe etwa gerade; die M.-A. unter sich um ihren Durchmesser, vom Clypeusrande fast so weit, von den S.-A. kaum so weit entfernt. Alle Tibien oben mitten 1 Stachel. Totallänge (NB. unreif!) 11 mm. Cephal. $5,5 \times 4,5$ mm. Abd. $5,5 \times 4$ mm. Beine: I. 21,5; II. 22,3; III. 16,9; IV. 19,8 mm. Palpen 7,3 mm. — Majunga (Voeltzkow) [M. B.].