Vinson, A. 1863. Aranéides des îles de la Réunion, Maurice et Madagascar. Paris: 277-278, 318.

Argyrodes viridis (Vinson, 1863)

1° Linyphie verte. (Linyphia viridis, Vinson.) (Pl. XI, fig. 4, 4, a.)

Long.: 3^{mm}. Femelle.

Abdomen ovale allongé, renslé en hauteur et en largeur dans son milieu, terminé en pointe, conique en dessous. Les silières occupent l'extrémité de ce cône.

Couleur générale: vert d'eau clair, tendre et presque transparent. A la loupe, tout le corps est semé de points du même vert, mais plus foncé, posés symétriquement, en échiquier: sur la ligne dorsale quatre points verts; pour la deuxième ligne, les points ne se trouvent pas dans la même direction, mais intercalés quoique plus bas et parallèlement. Quatre points pris isolément forment les extrémités d'une croix. Tout l'abdomen est semé de poils blancs.

Corselet vert comme l'abdomen : au centre un point plus foncé, sur le bord deux points en avant, deux en arrière, réunis l'un à l'autre d'un même côté par une ligne verte courbe.

Les pattes sont très-fines, très-allongées, d'un vert

plus pâle encore : les antérieures sont de moitié plus longues que les secondes : la troisième paire est la plus courte.

Les yeux sont noirs : quatre en carré, les latéraux unis.

Le dessous, les palpes, les màchoires, la lèvre sont de la même couleur que le reste et représentent les caractères des Linyphies.

J'ai trouvé cette délicate et très-petite Aranéide dans les feuilles d'un rosier Lamarck à Saint-Denis : à diverses fois je m'en suis procuré plusieurs exemplaires. Elle jette de petits fils irréguliers, se tient étendue, les pattes allongées dans la feuille ou sous son revers. — Le mâle, un peu plus petit que la femelle, et lui ressemblant en tout, ne s'en distingue que par son moindre volume, et ses palpes renflés à leur extrémité. Je les ai presque toujours trouvés non loin l'un de l'autre.

71. LINYPHIA VIRIDIS, Vins. Abdomine ovato, producto, fastigato infra; leniter et dilutè-viridi et ferè translucido: totum corpus conspersum est punctis viridioribus in quincuncem dispositis. Thorace viridi cum puncto spissè-viridi in medio, et duobus punctis ejusdem coloris antè et post, junctis ex utroque latere lineà viridi et curvà. — Pedibus productis, exilibus, subalbo-viridis.

