

Vinson, A. 1863. Aranéides des îles de la Réunion,  
Maurice et Madagascar. Paris: 269-270, 317.

*Argyrodes zonatus* (Walckenaer, 1842)

1° LINYPHIE PARASITE (*Linyphia parasita*, VINSON).

(Pl. XI, fig. 2.)

Long. : 5 à 7<sup>mm</sup> ; le mâle un peu plus petit.

Corselet rouge, brillant, glabre. Une dépression  
centrale et des rayons très-distincts. La tête est comme  
surlmontée d'un rostre noir, proéminent, qui porte les  
quatre yeux qui forment le carré intermédiaire, deux



en avant, deux en arrière, plus écartés ; chaque œil situé aux quatre coins d'un carré noir (Il faut examiner ces détails au microscope, sans quoi il y a confusion). Les yeux latéraux sont accolés : on les dirait sur les deux faces d'un petit cône, et se touchant par leur extrémité supérieure.

Abdomen très-allongé, ellipsoïde vu en dessus, triangulaire vu de profil à cause du renflement ventral à l'extrémité duquel se trouve la saillie des filières. — Couleur *rouge vermillon* avec deux raies obliques d'un beau jaune d'or sur les côtés, recourbées en haut et se réunissant sur le dos.

Ventre rouge vermillon ; une bande transversale noire en dessous au-devant des filières : plus en arrière, trois points noirs disposés en triangle.

Pattes noires, fines, allongées ; les antérieures plus longues avec le deuxième article jaune marron ; les autres entièrement noires. Les mandibules sont allongées, rouges, avec les palpes rouges terminés en brun, renflés en olive irrégulière, en forme de trompe évasée à l'extrémité, et qui rentre et sort par la pression du renflement olivaire de chaque palpe.

68. **LINYPHIA PARASITA**, *Vins*. Thorace rubro, splendente, glabro, depresso in centro. Abdomine productissimo, ovato, si spectes suprâ ; triangulari, si obliquè. Colore minio rubente, cum duobus lineis obliquis splendide flavis aureisque in lateribus. Ventre minio rubente, cum fasciâ transversâ nigrâ infrâ ; posteriora sunt tria puncta nigra triangulum efficientia.