

Berland, L. 1913. Description de deux espèces nouvelles d'araignides africaines du genre *Phoroncidia* Westwood (Araneae: Theridiidae). Bull. Mus. Hist. nat. Paris 1913: 77-78.

Phoroncidia rubroargentea nov. sp.

♀, long. : 4 millim. 5 (sans les épines postérieures). Céphalothorax très petit par rapport à l'abdomen : partie thoracique large, arrondie ; partie céphalique étroite, cylindrique, très saillante, de couleur ocre foncé avec trois fines lignes noires, une médiane droite et deux latérales courbes. Yeux situés sur une tache noire : première ligne procurvée, vue en avant, les médians plus gros que les latéraux, leur intervalle à peu près égal à leur




Fig. 4. — *P. rubroargentea* nov. sp., vu de profil. $\times 10$.

diamètre; médians de la seconde ligne aussi gros que ceux de la première, leur intervalle égal à leur rayon; latéraux des deux lignes se touchant. Bandeau concave au-dessous des yeux. Pièce labiale très large. Pièces buccales et sternum d'un vermillon clair, ainsi que les premiers articles des pattes; métatarses et tarses noirs. Abdomen très élevé, face dorsale carrée, horizontale et bombée en son milieu; côtés convexes, convergeant vers les filières, qui sont portées sur une petite éminence. Le dos, brun dans sa partie antérieure, porte quatre petites taches irrégulières et une médiane postérieure plus grande d'un blanc d'argent un peu doré; deux plaques de même couleur recouvrent presque toute la face antérieure et la moitié des flancs; la seconde moitié de ceux-ci est couverte par une grande et une petite plaque de chaque côté, et la face postérieure en compte également deux. Ces plaques sont séparées par des lignes fauves; la partie postérieure et les côtés du dos, ainsi que la face ventrale, sont d'un rouge pourpre vif réticulé. Le dos porte à chacun de ses quatre angles une épine horizontale noire à base large, brusquement rétrécie avant son extrémité, qui est très aigüe et munie de très petites barbelures latérales (fig. 4).

Provenance : Madagascar, forêt Tanala, entre Savondron et Andranomafana (Ch. Alluaud, 1902). 2 ♀ dans la collection du Muséum de Paris.

Cette espèce se rapproche beaucoup de *P. quadrispinella* Strand⁽¹⁾ de Nossibé. Elle en diffère — autant qu'on en peut juger d'après la description un peu courte — par la taille presque double et par la coloration, *P. quadrispinella* ayant, d'après E. Strand, les chélicères, le sternum et le ventre noirs.

L'existence de ces deux espèces porte à sept le nombre des *Phoroncidia* connues d'Afrique. En me basant sur les descriptions des auteurs pour celles que je n'ai pu voir, j'en donne le tableau ci-après :

- | | |
|--|---|
| 1. Épines abdominales en nombre impair..... | 2. |
| Épines abdominales en nombre pair..... | 4. |
| 2. Cinq épines | <i>P. aurata</i> Cambridge. |
| Sept épines..... | 3. |
| 3. Abdomen orné en dessus de 8 grandes plaques d'un rouge ferrugineux; face ventrale avec une tache rouge... .. | <i>P. rubens</i> Thorell. |
| Abdomen orné en dessus d'un grand nombre de plaques dont quelques-unes plus grandes; face ventrale avec une tache blanche..... | <i>P. splendida</i> Thorell. |
| 4. Abdomen plus long que large, sans plaques argentées..... | 5. |
| Abdomen aussi large que long, des plaques argentées..... | 6. |
| 5. Les quatre épines principales dirigées latéralement..... | |
| | <i>P. Sjostedti</i> Tullgren ⁽²⁾ . |
| Les quatre épines principales dirigées verticalement..... | |
| | <i>P. Ellenbergeri</i> Berland. |
| 6. Sternum et ventre noirs..... | <i>P. quadrispinella</i> Strand. |
| Sternum et ventre rouges..... | <i>P. rubroargentea</i> Berland. |

(1) *Zool. Anzeiger*, XXXI, 1907, p. 729.

(2) In : *Sjostedt's zool. Kilimandjaro-Meru Exp.*, III. Bd., 20, p. 137. — La diagnose de cette espèce est très peu explicative; aussi je la place ici sous toutes réserves.