

Simon, E. 1889. Etudes arachnologiques. 21e Mémoire.
XXXI. Descriptions d'espèces et the genres nouveaux de
Madagascar et de Mayotte. Ann. Soc. ent. Fr. (6) 8: 228-229.

9. *THERIDULA PERLATA*, sp. nov., ♂. — Long. 2 mill. — Cephalothorax pallide luridus, parte thoracica linea marginali exillima et macula media parva longitudinali nigricantibus notata. Oculi postici subæquales, in linea evidenter recurva et fere æquidistantes, spatiis diametro oculi circiter æquantibus sejuncti. Oculi antici in linea vix procurva, medii majores, inter se sat late remoti sed a lateralibus vix separati, area mediorum antice quam postice latior. Abdomen convexum, haud angulosum, breviter ovatum, albo-niveum, in parte prima tuberculis minutissimis punctiformibus sex in series transversas duas ordinatis et utrinque macula nigra elongata, in parte postica maculis vel guttis rotundis nigerrimis quatuor, quadratum designantibus, ornatum. Venter pallide testaceus, postice minute fusco-unipunctatus, regione epigasteris infuscata et leviter coriacea. Sternum luridum, utrinque ad angulum anteriorem minute nigro-punctatum. Pedes sat robusti, luridi, femoribus in medio, tibiis ad apicem angustissime fusco-subannulatis. Pedes-maxillares brevi, luridi, tarso bulboque rufulis, femore brevi et gracili, patella paulo longiore quam latiore, tibia brevissima et obliqua, tarso ovato, bulbo simplici. — Madagascar.

NOTA. Les deux espèces décrites par M. G. A. Butler, sous les noms de *Chryso nivropictus* (*nivipictus*) et *cordiformis* (in Proceed. zool. Soc. Lond., 1882, p. 763, pl. LVII, fig. 1-2), rentrent dans le genre *Theridula*; la première paraît même très voisine de *T. gonygaster* E. Sim., si elle n'en est pas synonyme. — Nous avons indiqué *T. gonygaster* de la côte occidentale d'Afrique.