

Simon, E. 1886. Espèces et genres nouveaux de la famille des Thomisidae. Act. Soc. linn. Bord. 40: 176-177.

Genus **Cyriogonus** nov. gen.

Cephalothorax postice convexus antice leviter declivis et sat attenuatus, fronte mediocri obtuse truncata haud carinata utrinque inter oculos laterales minutissime et obtusissime prominenti. Oculi postici minuti æqui in linea leviter recurva, medii a lateralibus quam inter se paulo remotiores. Oculi antici in linea validissime recurva, fere æquidistantes, medii lateralibus minores. Area mediorum longior quam latior et antice quam postice paulo latior. Clypeus verticalis area oculorum mediorum saltem $1/3$ angustior. Abdomen breve postice incrassatum et obtusum vel truncatum et utrinque prominens. Pedes robusti et sat longi (♀), metatarsis saltem anticis tibiis haud brevioribus, tarsis metatarsis multo brevioribus et gracilioribus. Tibiæ metatarsique antici aculeis brevissimis biscriatim ordinatis instructi. Pedes postici mutici. Tegumenta leviter coriacea setis brevissimis conspersa.

Gen. *Pistio* valde affinis differt, præsertim area oculorum mediorum latiore antice quam postice (in *Pistio* postice latiore).

12. **Cyriogonus lactifer** sp. nov. — ♀ long. 8-12^{mm}. — Cephalothorax subtilissime coriaceus et granulis rotundatis vage conspersus, flavo-testaceus supra vittis tribus albo-opacis plus minus obsoletis, lateralibus latioribus et laciniosis, ornatus, regione oculorum albo-opaca linea nigra aream acute triangularem designante limitata. Abdomen æque longum ac latum vel sæpius latius, antice obtusissime truncatum, postice valde ampliatus et utrinque rotundum, albido-opacum, in medio maculis inordinatis in lateribus et postice lineis curvatis pallide flavo-testaceis et levissime impressis notatum, infra albido-testaceum. Sternum chelæ pedes-maxillares pedesque flava, chelæ et pedes-maxillares albo-opaco marmorati, metatarsi tarsique antici leviter rufescenti-tincti. Tibiæ anticæ aculeis brevibus et robustis fulvis in series duas (5-5) basin articuli haud attingentes dispositis, metatarsi aculeis similibus 7-7 instructi. Vulvæ plaga fusco-rufula parva sat longe ante plicam sita, carina longitudinali lata et obtusa et utrinque fovea subrotunda tuberculum humile includente notata. — Madagascar.