

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 734.

*Thomisus lamperti* Strand n. sp.

♀. Mit *Th. albus* (Gm.) verwandt, aber Stirnhöcker spitzer und mehr emporgerichtet, Clypeus schmaler, Größe geringer, vordere M.-A. ein wenig mehr genähert, Femoralstacheln vorhanden usw. — Femoren I vorn 4, oben 1 (oder 1, 1?), II jedenfalls 1 oben, III oben 1, IV keinen; Tibien I unten vorn 1, 1, 1, 1, unten hinten 1, II unten 2 oder 2, 1, III—IV keine. Met. I—II unten vorn 6—7, unten hinten 5, III—IV vorn nahe der Spitze 1 Stachel, unten dicht beborstet. Epigyne erscheint gefeuchtet als ein schwarzer, hinten halbkreisförmiger, vorn quergeschnittener, von der Spalte um seine Breite entfernter Fleck. — 6,5 mm. Cephal. 2,9 × 2,7 mm. Abd. 4,5 × 3,8 mm. Beine: I. 11; II. 11,1; III. 5,1; IV. 6,1 mm. Palpen 2,25 mm. — ♂. Gelb, ockerfarbig angeflogen, Mundteile, Mandibeln, Femoren und Patellen I—II bräunlichgelb, Cephalothoraxseiten braun, Endglieder der Beine I—II dunkelbraun. Cephal. und Abd. dicht und kurz bestachelt. — 1,8 mm. Cephal. 1 × 1 mm. Abd. 1,2 × 0,9 mm. — Nossibé [M. L.].