

Strand, E. 1907. Diagnosen neuer Spinnen aus Madagaskar und Sansibar. Zool. Anz. 31: 734.

*Thomisus nossibeensis* Strand n. sp.

♀. Mit *Th. spinifer* O. P. Cbr. verwandt, aber Stirnhöcker länger und spitzer, Größe geringer, ein scharf markierter, weißer, V-förmiger Fleck auf Occiput nicht vorhanden, Bestachelung abweichend usw. — Alle Femoren oben mitten 1, I außerdem vorn 4 Stacheln; jedenfalls die Patellen III—IV oben an beiden Enden je 1 kleinen Stachel; Tibien I unten vorn 1, 1, unten hinten 1, II unten vorn 1, bisweilen auch unten hinten 1, alle Tibien oben 1, 1; Metat. I—II unten vorn 5, unten hinten 4 Stacheln. — Epigyne erscheint gefeuchtet schwarzbraun, etwa sechseckig, ein wenig breiter als lang, so lang als die Coxen IV breit, von der Spalte um kaum ihre halbe Länge entfernt. — Cephal. und Extrem. bräunlichgelb, Augenfeld und Stirnhöcker weiß gezeichnet, Femoren und Tibien I—II mit je einem rötlichbraunen Ring; Abdomen hellgelb, graubräunlich liniert. — 6,5 mm. Cephal. 2,7 × 2,5 mm. Abd. 4,5 × 3,5 mm. Beine: I. 10,2; II. 9,6; III. 4,8; IV. 5,8 mm. — Nossibé [M. L.].