

Una especie nueva de Gorytini

(Hym. Sphecidae)

Por MANFREDO A. FRITZ

Harpactostigma (Harpactostigma) patagonica sp. n.

DIAGNOSIS: Dos bandas abdominales blanco-lechosas la diferencian de inmediato de *H. uncinctum* (Br.) y su propodeo puntado lo separa de *H. velutinum* (Spin).

DESCRIPCIÓN: ♂. Negro, las siguientes partes blanco cremoso: labro, cípeo, mácula interantenal, franja en las órbitas internas, banda en el protórax, abarcando los callos humerales, manchas superiormente en las mesopleuras, escudete y postescudete casi totalmente, banda apical en los tergitos 2 y 3, mácula lateral en los esternitos 2 y 3. Ferruginosos: antenas, patas y segmentos abdominales 1 y 2. Alas levemente infumadas, más intensamente en la radial y hacia el ápice. Nervaduras café, más oscuras hacia el ápice. Especialmente las inferiores, iridiscentes.

Caracteres morfológicos: Cípeo y frente inferiormente con pubescencia plateada fina y densa; cuerpo y abdomen con pubescencia muy fina, conspicua y corta, que los cubre totalmente. Cabeza pulida y brillante, con escasos puntos aislados, muy poco marcados; vértex al nivel de los ojos; ocelos levemente elevados; frente con un surco bien marcado, desde los alvéolos antenales hasta el ocelo anterior; mandíbulas con un diente interno, cípeo mucho más ancho que largo; antenas largas, llegando a las tégulas, situadas en el tercio inferior de la frente; escapo largo y grueso, más largo que los dos primeros segmentos del flagelo; pedicelo pequeño; octavo segmento del flagelo ensanchado, excavado inferiormente; 9º y 10º segmentos del flagelo algo más largos que el 8º y también excavados; el último levemente más largo, curvo.

Tórax brillante y pulido; escudo del mesonoto con escasos puntos, aislados, irregulares, muy poco nítidos; mesopleuras con puntos más gruesos y densos que el escudo; suturas entre escudo y postescudete foveoladas. Facés laterales del propodeo con puntuación más gruesa y fuerte que en las mesopleuras; triángulo dorsal dividido longitudinalmente, bien definido, pulido y brillante; propodeo posteriormente rugoso. Tergitos con puntuación conspicua, muy fina y poco profunda; últimos tergitos con puntos más gruesos; esternitos con puntuación más marcada y aislada. Primer segmento abdominal no nodoso ni peciolado, más bien campanuliforme, recibiendo normalmente al segundo.

♀: Aparte de presentar las antenas sin excavaciones o modificaciones propias del macho y el área pigidial bien definida, tiene el color blanco cremoso de la cabeza más limitado; la pubescencia plateada de la cabeza es más densa.

DISTRIBUCIÓN: Argentina, Prov. Río Negro, Dto. Avellaneda, Lamarque, 20 ♂ 3 ♀, U. Fritz leg.; Choele-Choel, 5 ♂ 2 ♀, 24-XI-1946, Hayward-Willink leg.; Dto. Pichi Mahuida, Río Colorado, 2 ♂ 4 ♀, 14-19-XI-1946, Hayward-Willink leg.; Prov. Buenos Aires, Dto. Puñalón, Est. F. Sola, 1 ♀, J. R. de Martínez leg.

HOLOTYPUS ♂ y 19 **PARATYPI** ♂, **ALLOTYPUS** ♀ y 3 **PARATYPI** ♀ en mi colección; 7 **PARATYPI** ♂ y 6 **PARATYPI** ♀ en la colección del Instituto Miguel-Lillo, Tucumán.

DIMENSIONES: 9-10 mm.