

Miscellanea Entomologica

Organe international

contenant les demandes d'échange, d'achat et de vente de collections
livres ou objets d'histoire naturelle.

Anzeiger von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entomologen.

Entomologist's international Advertiser for exchange, purchase and sale.

Direction et Rédaction

E. BARTHE, à Cette, Hérault, (France).

Avec la collaboration de naturalistes de tous les pays.

Mit Mitwirkung internationaler Entomologen.



Le " **Miscellanea Entomologica** " paraît le 1^{er} de chaque mois.

Abonnement annuel : Union postale, fr. 5.

Die " **Miscellanea Entomologica** " erscheint am 1. jeden Monats.

Jährliche Subscription : 4 Mk. — Annual subscription : 4 sh.

tennes grêles, assez longues, presque filiformes, quelquefois obscurcies sur leurs derniers articles. Prothorax relativement court, assez dilaté arrondi en avant, muni dans sa partie basilaire d'une élévation gibbeuse, très nette vue de profil ; base sillonnée transversalement. Élytres à peine diminués aux épaules (un peu anguleuses), bien atténués à l'extrémité (tronquée), assez élargis au milieu, à ponctuation presque imperceptible, ornés de quelques poils clairs, épars, courts, mi-dressés. Dessous du corps brillant. Pattes grêles, assez courtes, avec les tibiaux postérieurs minces, les cuisses à peine épaissies.

Long. 3 mill. Texas. Acquis de M. H. Donckier.

Remarquable espèce se rapprochant par son prothorax si particulier des *Anthicus baetriannus* et *tumidicollis* Champ. (Biol. C. Am. Vol. IV Pt 2, p. 254) et différant nettement de ces espèces par la coloration et la forme un peu moins étroite.

Anthicus mexicanus n. sp. — Grand, modérément allongé, brillant, noir, avec la base extrême du prothorax, une tache humérale et vaguement l'extrémité des élytres brunâtre; base des antennes et pattes roussâtres avec les cuisses obscurcies. Ponctuation générale à peu près uniforme, forte et écartée ; pubescence grisâtre, couchée, assez fine. Tête très longue, tronquée-arrondie en arrière, assez large dans cette partie, bien atténuée en avant avec les yeux gris peu saillants ; antennes modérément courtes, peu épaissies. Prothorax en trapèze, dilaté-arrondi en avant, à peine plus large que la tête dans cette partie assez diminuée en arrière, courtement droit sur les côtés, avec la base sillonnée transversalement. Élytres à côtés presque parallèles, peu déprimés, à épaules et extrémité bien arrondies, d'un noir vaguement bleuâtre, ornés d'une petite tache humérale externe d'un brunâtre roux avec l'extrémité étroitement de la même couleur. Dessous du corps noir, pubescent de gris. Pattes longues avec les cuisses (postérieures un peu sinuées) dilatées.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ mill. Mexique. 1 ex. (probablement ♂) reçu

indéterminé de M. E. Reitter.

A ranger je pense dans le voisinage de *A. infernus* Laf. ; rappelle un peu notre *Anthicus* européen *brunneus* Laf., mais plus fort et plus large ; moins élargi aux élytres que *A. fulripes* Laf. et espèces voisines.

MAURICE PIC.

Hymenopterorum novorum diagnoses præcursoriæ.

II.

7. **Bembex expansa.** — Fusco-nigra, parum nitida, sat dense albogrisea pilosella ; labro, mandibulis, callis humeralibus, alarum tegulis, macula metapleurarum, scutelli marginibus posticis pedibusque flavo-citrinis ; abdominis segmentis flavo-fasciatis : fasciis flexuosis, secunda utrinque nigro submaculata ; ano nigro ; femoribus inermibus ; tarsorum intermediorum articulo primo in laminam sat conspicuam, margine arcuatam, apice pellucida, dilatato ; segmento ventrali secundo carinula elevatissima subspinoidea armato, sexto tuberculo robusto depresso-plano apice acuto prædito ; alis hyalinis. ♂.

Long. corp. mill. 17.

hab. *Saganëiti* (Abyssinia).

8. **Larra Jugurthæ.** — Nigerrima, facie, mesopleuris et area epipygiali dense argenteo villosis ; capite, thorace, pedibus et segmentis abdominalis 1-5 argenteo pruinosis ; alis subinfuscatis ; fronte ut in *L. nigrita* Lep. ; mesothorace confertim tenuissime punctulato ; scutello nitido ; metathorace latitudine longiore uniformiter reticulato, medio linea tenuissima elevata ; lamina epipygiali complanata, elliptica, bene marginata, apice parce punctinata. ♀.

♂ metathoracis area postica transversim rugosa ; pygidio apice truncato integro.

Long. corp. ♀ mill. 9-10, ♂ mill. 7-9.

hab. *Roghari, Biskra* (Algiria).

9. **Cerceris teterrima.** — Robusta, nigro-fuliginosa, immaculata, alis infuscatis ; capite magno subeubico ; ore latissimo ; clypeo medio inflato subproducto vel subtuberculato ; tuberculo supra recte truncato ; pro- et meso-thorace parce sed profunde punc-

tatis ; metathorace confertissime punctato-granoso ; area cordiformi opaca, medio sulcata. utrinque oblique rugoso-punctata ; abdomine dorso sat dense punctulato : segmento primo robusto, transverso ; peltha epipygiali elliptica, coriacea. ♀.

Long. corp. mill. 16.

Hab. *Algiria et Tunisia.*

10. **Diodontus crassicornis.** — Affinis *D. minuto* ; differt antennis valde robustioribus et nonnihil brevioribus, articulis magis latis quam longis, immaculatis ; dorsulo paullulum densius et crassius punctato, interstitiis politis, haud coriaceis. ♂.

Long. corp. mill. 4, 5.

Hab. *Constantina, Teniet-el-Haad* (Algiria).

11. **Diodontus punicus.** — *D. medio et tristi* valde affinis dignoscitur callis humeralibus eburneis ; capite robustiori, labri margine magis rotundato profundius emarginato ; antennarum scapo minus incrassato ; capite dorsuloque confertissime minutissime punctulatis ; mesopleuris transversim strigosis ; metanoto crasse irregulariter subreticulato-rugoso ; metapleuris tuberculis duobus validissimis acutissimis armatis ; alis hyalinis. ♀ genibus tarsisque 4 anticis, tibiisque anterioribus antice ferruginescentibus — ♂ mandibulis, palpis, tibiis anterioribus antice, posterioribus basi, tarsisque anticis eburneis.

Long. corp. mill. 3.5-4.5.

Hab. *Algiria et Tunisia* (local. plur.)

12. **Trypoxylon Hannibalis.** — *T. fígulo et attenuato* affinis dignoscitur metanoto oblique subtilius et regulariter strigoso ; abdomine multo gracilliori ; segmento 1º elongato, femora postica excedens, duobus sequentibus attamen manifeste brevior, ante marginem tumidiusculo : segmento 2º duplo longiore quam lato ; sequentibus subcompressisculis. ♂ ♀.

Long. corp. ♀ mill. 7-8, ♂ mill. 6.

Hab. *Boghari, Biskra* (Algiria).

13. **Crabro** (*Blepharipus*) **herinaceus.** — Gracilis niger nitidissimus, mandibulis, antennarum scapo, maculis duabus facialibus, callis humeralibus, scutello, genibus tibiis tarsisque 4 anticis, tibiis posticis basi, maculis lateralibus segmentis 1º, 5º, 5º citrinis ; alis hyalinis, venis tegulisque testaceis ; capite magno, vertice nec depresso neque foveato ; clypeo medio corniculato ; pronoto conspicue elevato ; prosterno utrinque spinoso ; dorsulo nitidissimo, parce sat crasse punctato ; scutello impunctato ; metanoto tenuissime coriaceo ; area cordiformi nitida, medio caualiculata ; tibiis posticis spinulosis ; abdomine gracili, subpetiolato nitido. — ♀ Trochanteribus intermediis infra tuberculatis ; tibiis intermediis compressis, ante apicem intra emarginatis, hinc angulatis. — ♂ Pronoti angulis lateralibus spinoideis.

Long. corp. ♀ mill. 6, 5-7 ; ♂ mill. 5-7.

Hab. *Algiria et Tunisia* (plur. local.)

14. **Leptochilus Jacinthæ.** — Subgracilis viridis metallicus modice nitidus, clypeo basi supra excepta) eburneo ; antennis nigris ; alis fuscis, ad costam obscurioribus ; corpore confertim tenuiter punctato-granoso, abdominis segmento secundo (margine excepto), anoque confertim tenuiter punctulatis ; clypeo apice truncato, medio margine depresso hinc bidentato apparet) ; segmento abdominis 1º subpetioliformi, infundibuliformi-subcampanulato. ♀.

Long. corp. mill. 12.

Hab. *Humboldt-Bay* (Nova-Guinea).

Auguste Taurinorum, d. IV. Kal. februarias 1894.

JOHANNES GRIBODO.

