

*H. Schaus
Donor*

*DIV. INSTINCTS
S. GAT. NO.*

MITTHEILUNGEN

DER

SCHWEIZERISCHEN

ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE SUISSE.

Redigirt von
Dr. GUSTAV STIERLIN
IN SCHAFFHAUSEN.



Vol. VIII. Heft Nr. 7.

Datum der Herausgabe: Juli 1891.

1891.

SCHAFFHAUSEN.

Commissions-Verlag von Huber & Comp. (Hans Körber) Bern.

Hymenoptères nouveaux de Madagascar.

par Mr. Henri de Saussure.

Scoliidae.

1. *Tiphia bisinnata*. — Nigra, punctata, cinereo-pilosa; capite compresso, ocellis in plano frontis jacentibus; facie rugis supraantennalibus prominulis; antennis subtus ferrugineis; pronoto grosse cribroso, limbo postico vitta lata polita, picea, margine postico bisinuato, tegulis grandibus, retroproductis; metathorace eanthis omnibus acute-carinatis, facie postica convexa; obduminis 1^o segmento supra basi acutissime marginato; segmentis 3^o—5^o rugose-punctatis; pedibus nigris, rufescens-pilosis; alis fusco-violaceis. ♀.

2. *Scolia (Discolia) hova*. ♀. Nigra, nigro-hirta; capite et thorace confertim punctatis; *postscutello et metanoto luevigatis, politis*, nitidis, vel serieantibus; abdomine subtiliter punctato; alis ferrugineis, limbo apicali latiusculo nebuloso, cyanescente. Variat: a. Antennis apice verticille rufo-aurantiis. — b. Capite et thorace, abdominis basi pedibusque obscure rufis vel nigro-variegatis, pilis nigris, antennis apice flavis. — c. Tota rufo-castanea. — d. Nigra, alis ♀ fusco-eyaneis, costa aurantiae. L. 25—27 mm.

3. *Sc. ambidens*. ♀. Atra; thorace confertim cribrose punctato, metanoto densissime punctato; capite obscure rufescente; abdomine cyanescente, 1^o segmento basi et utrinque obsolete tuberculato; alis nigro-violaceis, vitta costali aurantia, areola radiali lata, obtusa, 2^{am} areolam cubitalem haud superante. L. 22 mm.

4. *Sc. madecassa*. ♀. Valida, nigra, nigro-hirta, confertim cribroso-punctata; metathorace supra, posterius et in pleuris dense punctulato; abdominis primo segmento grosse sparse punctato, basi haud tuberculato; 2ⁱ et 3ⁱⁱ margine brevissime cinereo-fimbriato; antennis apice rufis vel flavis; alis ferruginescensibus, venis et costa ferruginea, limbo apicali late nebuloso, subcyanescente. L. 28 mm.

Variat; — a. Capite rufescente. — b. Capite, antennarum basi, pronoto, tegulis, scutello et postscutello, pleuris, metathorae medio et posterius utrinque, rufis; pedibus rufescensibus. — c. Thorace fere toto rufo; mesonoto cum signatura U-formi rufa. — d. Alae hyalino-ferruginea. — e. Alae obscuriores.

♂. Niger, omnino densissime punctatus, longiuscule cinereo-fulvescente tomentosus; antennarum articulis apicalibus 3 aurantiis, ore et antennarum scapo subtus rufis; capite et thorace nigro- et fusco-hirtis; abdome haud vel vix coerulecente, confertim cinereo-tomentoso, cinerescente, longiuscule piloso, segmentis 2^o, 3^o breviter cinereo-fimbriatis; primo segmento latiusculo; pedibus saltem tarsis rufescensibus; alis quam in feminis pallidioribus, areola radiali areolam secundam cubitalem plus minus quam tertia parte marginis inferi superante. — *Variat.* — *a.* Capite, pronoto et scutello, rufescensibus. — *b.* Antennis subtus et pedibus nigris. — *c.* Antennis totis nigris. L. 24 mm.

5. **Sc. Kirbyana.** ♀. Nigra, fulvo-hirta, cinerescens, capite et thorace confertim crasse punctatis; Capite minuto, nunc nigro, nunc rufescens; antennis castaneis, articulis 3 ultimis oehraceis; thorace anterius fuseo-setoso; postscutello et metanoto dense punctatis; hoc dense longiuscule fulvo-tomentoso, posterius exciso, utrinque angulato; abdome sparse punctato, ovato, pilis fulvis appressis hirto; segmentis 1^o—3^o fulvo-fimbriatis, reliquis fusco-setosis; pedibus nigro-rufescensibus, fusco-pilosus; alis ferruginescentibus, limbo late nebuloso; areola radiali angusta, valde obliqua, secundam areolam cubitalem paulum superante. L. 22 mm.

6. **Sc. Heydenii.** ♂. Minutus, gracilis, niger, cinereo-hirtellus, punctulatus; antennis subtus et apice ferrugineis; abdome eyanescente, apice, nec non fascia transversa media segmentorum 2ⁱ—3ⁱ rufis; sequentibus obscure rufis; alis ferrugineis. L. 14 mm.

7. **Elis (Trielis) punctum.** ♀. Sat parva, nigra, punctata, fulvo-cinereo-hirsuta; fronte supra antennas transverse canaliculato, inter antennas lato, prominulo; clypeo medio quadrato, prominulo, valde strigato; metathorace postice toto excavato, marginibus omnibus aeutis; abdome flavo-rufo longe piloso, segmentis 1^o—5^o fimbriatis, 6^o nudo, rugoso; tibiarum posticarum calcaribus binis spatulatis; alis nebulosis, venis nigris, costa ultra medium nigra, stigmata grandi, opaco; areolis cubitalibus 3; 2^a antice angulata, haud petiolata. L. 15 mm.

8. **E. (Trielis) Elliotiana.** ♀. Sat parva, gracilis, tota atra, metathorace etsi postice conferim punctato, marginibus posticis valde rotundatis; femoribus ad castaneo-testaceum vergentibus; calcaribus tibiarum posticarum longissimis, gracilibus, interno apice leviter spatuliformi; alis nigro-coeruleis; areolis cubitalibus 3; 2^a breviter petiolata; tertia postice parum coarcata. L. 16 mm.

9. **E. (Dielis) barbata.** ♀. Minor, nigra, punctata, capite et thorace longe rufo-hirsutis; metathorace supra confer-
tim punctulato, medio margine angulatum retro-producto, faciei posticae marginibus haud acutis; abdominis segmentis 1^o—4^o albido-fimbriatis, 5^o et 6^o fusco-setosis; pedibus albido-pilosis; alis subhyalinis, venis ferrugineis, dimidia parte apicali nebulosa, subcyanescente. L. 16 mm.

Mutillidae.

1. **Mutilla fracta.** Gracilis, nigra, cinereo-pilosa, superne nigro-hirta; capite et thorace crasse punctatis; thorace toto rufo, elongato-cubico, facie postica plana, tenuiter punctata; abdomine nigro; primo segmento majusculo, cupuliformi, apice maculis 2 albis; 2^o elongato, immaculato, 3^o maculis 2 albis; 5^o, 6^o totis albopilosis; carina ventrali primi segmenti valde prominula, anterius elevatiore. ♀ L. 10 mm.

2. **M. Radovae.** Nigra, albo-maculosa, supra nigro-, subtus cinereo-pilosa; capite et thorace crassissime reticulato-punctatis; capite inflato, rotundato; thorace parallelo, elongato-quadrato, truncato; metathorace tuberculoso-scabro, thoracis dorso rufescente, marginibus crenatis, lobulatis; abdomine sessili, 1^o segmento magno, eupuliformi, apice maculis 2; secundo margine albido-fimbriato, in medio nigro; tertio maculis 2 in margine secundi partim extensis; sexto albo-piloso. ♀ L. 15 mm.

3. **M. leucopis.** Media, capite thoraceque rufis, scabris; antennis pedibusque rufis, superne obscurioribus; pronoto quadrato, postice dilatatiuscule; abdomine subsessili, nigro; secundi segmenti basi maculis 2 argenteis; segmentis 1^o, 2^o argenteo-fimbriatis, reliquis argenteo-vestitis; pygidio strigato. ♀ L. 10 mm.

4. **M. biseriata.** Atra, cinereo-pilosa, crasse punctata; capite minore, prouti latitudine; pronoto elongato-quadrato, retro paulum latiore, superne crassissime punctato, rugoso; metanoto rotundato; abdomine ovato, velutino, 2^o segmento macula basali et 2 apicalibus, 3^o, 4^o punctis 2 marginis, 6^o macula utrinque, albis; pygidio subtiliter punctato, rotundato; primo segmento rotundato squamiformi, carina infera biemarginata, bidentata. ♀ L. 8—9 mm.

5. **M. hova.** — Minor; nigra, cribroso-punctata, albido pilosa; vertice et pronoto rufescensibus; thorace angusto, posterius latiore, marginibus rotundatis, rugosis; abdomine subsessili, secundi segmenti baseos maculis 2 magnis argenteo-flavocantibus; segmentis 3^o—5^o argenteis, 6^o tenuiter marginato, punctulato, fusco. ♀ Lg. 9 mm.

6. **M. Radamae.** — Nigra, albo-maculosa, supra nigro-, subtus cinereo-pilosa; capite et thorace crassissime reticulato-punctatis, capite inflato, rotundato, thorace retro subattenuato, postice rotundato-truncato; abdomine sessili; primo segmento magno, cupuliformi, apice maculis 2, tertio maculis 2 in margine secundi partim extensis, quinto maculis 2 superis, sexto basi macula transversa, argenteis. ♀ L. 15—16 mm.

7. **M. Dewitziana.** — Nigra, cinereo-pilosa, argenteo-maculosa; capite minore, rotundato, valde punctato, superne et anterius nigro-piloso; thorace angusto, subcompresso, parallelo, postice rotundato-truncato, antice margine et angulis hebetatis; dorso rufo crasse reticulato-punctato, nigro-piloso, marginibus lateralibus acutis, triundatis; pleuris infera argentatis; abdomine subsessili; primo segmento postice rotundato-squamiformi, macula alba; secundo maculis 2 in medio, invicem remotis; tertio macula utrinque transversa, 5^o macula media transversa, argenteis; pygidio utrinque albido-, et nigro-piloso. ♀ L. 14—15 mm.

8. **M. malagassa.** — Nigra, albido-pilosa, capite et thorace supra nigro-pilosus; antennis subtus rufescens; capite supra oculos inflato, crasse punctato, fronte minus rugoso; thorace cuboideo, supra rufo, rugosissimo, crassissime foveolato-punctato, in medio longitudinaliter costato; marginibus crenatis; abdomine superne atro, primo segmento cupuliformi, subsessili, apice macula alba, secundo ante marginem maculis 2 albis; 3^o—5^o in medio macula albido-flavante; ano nigro; subtus et pedibus cinereo-hirsutis; harum spinis et tarsis rufo-testaceis. ♀ L. 11 mm.

9. **M. penetrata**, Smith. — Statura mediocri; capite, thorace pedibusque obscure rufis, vertice nigrescente; capite valido, quam pronotum latiore; pronoto cubico, grosse cribroso, antice et postice angulatim truncato; abdomine ovato, nigro; primo segmento macula, secundo maculis 3 orbicularibus, segmentis 3^o—5^o in medio margine macula, argenteis; segmentis subtus albo-fimbriatis; pedibus albo-pilosus. ♀ L. 12 mm.

10. **M. costata**. — Nigra, albido-pilosa; capite mediocri, grosse punctato, antennis supra rufescens, thorace rufo, quam latiore paulo longiore, subcubico, superne in longitudinem multicostato; pleuris concavis, nitidis; metathorace posterius et in pleuris nitido, subtiliter punctato; abdomine sessili, primo segmento squamiformi appresso, apice macula minuta, secundo maculis in medio 2 invicem remotis, nec non penicillo in medio margine, argenteatis; tertio segmento argentato; ultimo albo-piloso. ♀ L. 10 mm.

11. **M. mephitis**, Smith. — Sat valida, nigra, albido-hirsuta, argenteo-maculosa; capite medio, vertice transverse acute

carinato, facie argentea; thorace anterius lato, angulato, posterius coarctato, rotundato-truncato, superius rugosissimo; pleuris inferius argentatis, mesopleuris carina prominula longe albido-ciliata instructis; abdomine breviter petiolato, primo segmento breviter petiolari apice subnodiformi, argenteo-marginato; 2^o basi maeula, apice maculis 4 in serie transversali, 5^o macula media, argenteis. ♀ L. 12—18 mm.

12. *M. Hildebrandti*. — Modice parva; capite minore; capite et thorace rufis, inferius cinereo-pilosus, de reliquo rufo, et nigro-pilosis, omnino dense punctatis; antennis rufis, flagello superne obscuro; thorace parallelipipedo, retro dilatatusculo ac truncato; abdomine nigro-velutino; subsessili, 1^o segmento squamiformi, aurato; 2^o basi macula, apice maculis 2 grandibus, aureis; 3^o maculis grandibus 2, 5^o limbo, 6^o toto, aureis; pedibus nigris, fulvo-pilosus. ♀ L. 10 mm.

13. *M. venustula*. — Modice grandis vel minuta, cinereo-hirta; capite thoraceque rufis; thorace elongato-quadrato, posterius truncato; abdomine nigro, 2^o segmento basi aureo-bimaculato, margineque anguste aureo et in medio macula aurea; segmentis 3^o, 4^o superne aureis, antennarum flagello nigro; tarsis fuscis. ♀ L. 6,3—10 mm.

14. *M. zanaca*. — Minuta, cinereo-hirta, capite thoraceque rufis; antennis, abdomine pedibusque nigris; thorace parallelipipedo; abdomine ovato, 2^o segmento basi maculis 2 auratis, 3^o, 4^o auratis. ♀ L. 7—9 mm.

15. *M. betsilea*. — ♀ Rufa, valde punctata; capite quam pronotum haud latiore; thorace elongato-quadrato, fusco- et cinereo-pilosus; abdomine nigro-velutino; secundo segmento basi maculis ovatis 2 aureis, ac lateraliter margine infero aureo-limbato; segmentis reliquis aurantiis, aureo-pilosus, subtus 2^o-6^o aureo-fimbriatis. L. 18 mm.

♂ Niger; capite thoraceque rufis, cinereo-pilosus; antennis basi rufis, dehinc fuscis, 3^o articulo trigonali, intus dentato, vel penicillo pilorum alborum instructis, thorace anterius valde fornicato, scutello fere in tuberculum prominulo; abdomine nigro, 1^o segmento anguste-infundibuliformi, 2^o basi maculis 2 aureis; reliquis totis aureis, ultimis rufo-cupreis; pedibus nigris; alis nigro-violaceis basi area vitrea. L. 19 mm.

16. *M. antsianacea*. — Nigra; thorace elongato-quadrato, modice grosse punctato; antennis basi rufis; abdominalis 2^o segmento basi maculis ovatis 2, apiceque macula elongata, nec non lateraliter margine angusto cum maculis conjuncto, aureis; margine postico nonnunquam angustissime aureo cum macula marginis effusa; segmentis 4—6 rufis, aureo-, et rufo-pilosus; pedibus rufis. ♀ L. 8—13 mm.

17. **M. madecassa.** — Rufa; antennis, pedibusque nigris; thorace elongato, subcompresso, retro-augustato, utrinque excavato; pronoto utrinque minute tuberculato; dorso crasse strigosopunctato; metanoto subtruncato; abdomine nigro, subsessili; secundo segmento basi utrinque, apiceque macula rotundata, aureis; 3^o segmento toto aureo-piloso, 4^o fusco, 6^o aureo-piloso. ♀ L. 17 mm.

18. **M. rubro-aurea**, R. et S. — Sat minuta, nigro-pilosa; capite medioeri thoraceque rufo-aureis vel rufis, confertim punctatis, antennis nigris basi rufis; thorace supra convexo, hexagonalis, utrinque in tuberculum dilatato, posterius angustiore; abdomine ovato, nigro-velutino, primo segmento brevi, squamiformi; 2^o basi maculis 3, apice 1, rufo-aureis, 3^o, 4^o supra totis rufo-aureis; 6^o supra laeviusculo, subtiliter strigato ac punctato; pedibus rufis vel fuscescentibus. ♀ L. 9 mm.

Var.: 6^o segmento basi aureo-tomentoso.

19. **M. Grandidieri.** — Atra, cinereo-hirta; confertim punctata; thorace convexo, elongato-quadrato, postice paulo angustiore; capite quam pronotum vix angustiore, mesonoti disco anterius arcuato; abdomine subsessili, primi segmenti carina ventrali ad 1^m typum pertinente; 2^o segmento dimidia parte basali aurea, macula basali nigra; segmentis 3^o—6^o aureis; fasciis 3ⁱⁱ—5ⁱⁱ basi leviter incisis; subtus 2^o—6^o aureo-marginatis; epipygidio punctato, posterius utrinque dente marginali instructo. ♀ L. 17 mm.

20. **M. guttata**, Sm. — Capite thoraceque nigris; hoc superne obscure rufo; thorace ovato; abdomine nigro, breviter petiolato, petiolo albido-pilosello; 2^o segmento macula media basali maculisque ovatis 2 ad marginem posticum, nec non ultimo segmento macula, aureis; pedibus subanreo-pilosis. ♀ L. 11 mm.

21. **M. calamistrata.** — Nigra, punctulata, nigro-pilosa; capite thoraci aequilato; hoc ovato-pisiformi, utrinque tuberculato, postice valde attenuato; pronoti primo segmento elevatnodoso-petiolaris, toto angusto, convexo, superne longe aureo-appresso-piloso, 2^o nigro, pilis nigris appressis, basi macula longitudinali longe aureo-pilosa, margine postico lato, aureo, litura aurea antice bisinuata, setis aureis symetrice arcuatis composita, reliquis segmentis superne longe aureo-pilosis. ♀ L. 16 mm.

22. **M. gigantea.** Maxima, nigra, nigro-hirsuta; capite minuto, oculis sinuatis; pronoti margine postico in medio valde arcuato; scutello tuberculato; metanoto rugosissimo, biangulato; abdomine petiolato, petiolo trigonalis, ejus carina ventrali mucronata; capite et thorace obscure rufis, metanoto superne nigro;

abdominis segmentorum 3^o—5^o margine anoque, cupreο-rufis; pedibus cinereo-hirtis; alis nigro-violaceis, basi inter venas breviter hyalinis, areolis cubitalibus 3. ♂ L. 30 mm.

23. **M. Sichelii.** — Nigra, punctata, cinereo-hirta; abdome rufo, rufo-cupreο-piloso; alis infuscatis, violascentibus, basi subhyalinis, areolis cubitalibus 3. ♀ L. 12 mm.

24. **M. atricula.** — Nigra, longe canescente-pilosa; antennis apice ferrugineo; capite minore, ocellis parvis, pronoto et metanoto argentatis; mesonoto et scutello valde punctatis, nigro-pilosus, hoc apice dentato; postscutello infra scutellum invaginato, polito; metathorace truncale, latere posteriore reticulato; abdomine breviter petiolato, rufo; petiolo nigro, apice rufo; segmentis 6^o, 7^o nigris; alis ultra medium infuscatis. ♂ L. 13 mm.

25. **Methoca Camboni**ni. — Nigra, nitida, albido pilosella; antennis basin versus, mandibulis, pedibus, saltem tarsis, obscure rufescens; capite et thorace cibroso-punctatis; capite valido, vertice crasso, parum arcuato, facie valde bifoveolata; mesonoto haud compresso, utrinque strigato, superne punctato; scutello convexo, haud tuberculiformi. ♀ L. 10 mm.

Sphegidae.

1. **Chlorion forticula.** — Rufo-ferrugineum; verticis macula sulcisque thoracis laterum, nigris; antennis pedibusque ferrugineis; abdome violaceo; pronoto crasse, metanoto subtiliter strigatis; alis flavo-ferrugineis, limbo apicali late fusco-violaceo. ♀ L. 23 mm.

2. **Sphex malagassus.** — Niger; cinereo-hirtus, haud argenteo-nitens; capite rufo, supra nigro; clypeo breviuseulo, margine infero medio subbidentulo; antennarum articulis basalibus 2 rufis; prothoracis et mesothoracis lateribus rufo-variis; scutello et postscutello planulis, illo sulco diviso; metathorace punctulato, haud strigato; alis hyalino-flavicantibus; 1^a v. recurrente interstitiali; 2^a ar. cubitali ultra medium areolae radialis exserta. — ♀ Ore, clypeo et facie rufis. — ♂ Clypeo et facie aureo-tomentosis. L. ♀ 25, ♂ 22 mm.

3. **Sph. leoninus.** — Validus, ater; capite, thorace, coxis abdominisque primi segmenti pars pendunculari longe ac dense fulvo-aureo hirsutis, metanoto aurantio-rufescente-hirsuto; abdome profunde nigro velutino; primi segmenti dimidia parte apicali infundibuliformi, bidentata; femoribus tumidis, tarsis intermediis postieisque fulvis, sericantibus, metatarso postico crasso,

incurvo; unguibus nigris; alis subhyalinis, nebulosis, venis costae nigris, reliquis brunneis. ♂ L. 37 mm.

4. **Bembex madecassa.** — Nigra, griseo-hirsuta; antennarum apice subtus ferrugineo; vertice compresso-tuberculato; mandibulis, labro, clypei margine infero, metanoti canthis inferis, pallide sulfureis; abdominis segmentorum 1ⁱ—5ⁱ fascia repanda sulfurea, prima interrupta, reliquis subinterruptis, 2^a bifurcata; pedibus flavis, femoribus nigro-variis; alis hyalinis, ar. radiali 3^{am} cubitalem haud superante. ♀ L. 15 mm.

5. **B. erinita.** — Gracilis, nigra, cinereo-hirsuta; mandibulis labroque sulfureo-limbatis; clypei angulis sulfureis; abdominis segmentis 2^o, 3^o litura angusta interrupta et sinuata ornatis; pedibus nigro-, flavoque variis; alis hyalinis, venis testaceis; 2^a ar. cubitali radiale versus coaretata. ♀ L. 15 mm.

6. **Bembex militaris.** — Gracilis, nigra, cinereo-hirsuta, sulfureo multipicta; clypeo brevi; capite flavo, vertice nigro, flavo 3-fasciato; antennis subtus ferrugineis scapo flavo; thorace subtus flavo; pronoto, mesonoti lineis 4 longitudinalibus, 1 transversali, metanoti fascia arcuata canthisque, flavis; abdominis segmentis 1^o—5^o fascia flava; fascia 2^a lata nigro-bimaculata; sequentibus repandis; ano flavo-maculato; pedibus flavis, nigro-lineatis; alis minutis, hyalinis; 2^a ar. cubitali fere quadrata. ♀ L. 14 mm.

7. **Tachytes oviventris.** — Minor, niger, fulvo-tomentosus; clypei angulis inermibus; oculis superius rotundatis, invicem sat remotis; thorace coriaceo; scutello convexo, metanoto rotundato, inferne inconspicue substrigato, postice plano, per sulcum angustum diviso, superius subtuberculato; abdomine ovato, coerulecente; segmentorum 1ⁱ, 2ⁱ limbo polito, brunneo-testaceo; 5^o, 6^o supra rufo-pilosus; pygidio V-formis, marginato, apice rotundato; metatarsis anticus extus 6-spinosis; tibiis posticis extus superne triseriatim spinosis; alis subhyalinis, areola radiali acuminata, haud truncata. ♀ L. 11 mm.

8. **Notogonia Radamae.** — Minuta, nigra, cinereo-hirta; metathorace elongatusculo, acute marginato, superne tenuiter punctato-strigato; metapleuris strigatis; partim laevigatis; abdominis segmentis in dorso subargenteo-limbatis, in ventre haud sinuatis; femoribus posticis haud deformibus; alis hyalinis apice griseis, 3^a ar. cubitali posterius dilatata, valde obliqua. ♂ L. 8 mm.

9. **N. ancara.** — Nigra, cinereo-argenteo-sericans; oculis valde convergentibus; pronoto superne angulato-rotundato; mesonoto per sulcum obsolete diviso; metathorace aequo longo acato, supra obsolete transverse strigato, marginibus acutis; abdome subargenteo-plagiato, nitido, epipygio angusto; tarsis

rufescens; alis nebulosis apice griseo-limbatis; areola cubitali elongata. ♀ L. 15 mm.

10. *N. avellanipes*. — Gracilis, nigra, cinereo-sericans; *N. ancarae* simillima at minor ac gracilior; clypei margine depresso, nudo, nitido; metathorace longiore quam latiore, striolato; metapleuris postice pliculatis; abdomine haud argenteo-plagiato; tegulis et pedibus rufis, coxis et trochanteribus nigris; alis nebulosis, venis nigris. ♀ L. 13 mm.

11. *N. Heidenii*. — Nigra, punctulata, gracilis, cinereo-hirta; antennarum scapo pedibusque rufis; verticis scutello modice gibberoso, mesonoto anterius vix tumido; tegulis testaceis; metathorace angustulo, longiusculo, confertim punctulato; postice strigoso; pleuris punctatis; abdomine gracili, polito; pedum spinis fuscis; femoribus et tibiis crassiusculis; alis diaphano-fusca. ♀ L. 15 mm.

12. *Philanthus bimacula*. — Niger, punctulatus; antennis rufis supra partim nigris; macula mandibularum, clypeo, faciei margine infero maculaque utrinque clypei, vitta subangulata interantennali, vitta frontis, pronoti cantho maculisque 2 transversis abd. 2ⁱ segmenti, sulfureis; tegulis, strigis utrinque 2 mesonoti maculisque pleurarum, rufis; pedibus rufis flavo-variis, posticis partim nigrescentibus; alis ferruginescens; venis ferrugineis. ♀ L. 13 mm.

13. *Cerceris petiolata*. — Sat minuta, nigra, eribrosa; antennis nigris; clypeo, ejus lobis lateralibus, orbitis intus, sulfureis; mandibulis, linea interantennali, pronoto, tegulisque rufis; trigono metanoti regulari, laeviusculo; abd. 1^o segmento elongato, toto petiolari, linearis, basi utrinque subbituberculato, in medio subconstricto; 2^o segm. triangulari, utrinque macula et limbo anguste flavo; 3^o flavo, macula nigra; 6^o, 7^o flavis; omnibus inter se valde sejunctis; pedibus nigris, tibiis et tarsis rufescentibus; alis nebulosis, venis fuscis, stigmata ferrugineo. ♂ L. 9 mm.

14. *C. formidolosa*. — Nigra, confertim punctata; fronte inter antennas carina aenta, facie flava; clypeo elongato, laeviusculo, supra et utrinque nigro, ante apicem tuberculis minutis 2; vertice lato, plano; thorace toto punctato; metanoti trigono basali valde strigato; abdominis 1ⁱ segmento flavo-marginato; pygidio carinis rectis 2 acutis retro convergentibus et inter illas subcanaliculato; alis ferrugineis. ♀ L. 15 mm.

15. *C. Hildebrandti*. — Nigra, punctulata; antennarum scapo subtus apice imo, clypeo medio, mandibulis mediis abdominalisque 2ⁱ segm. margine ferruginescens; fronte inter antennas compresso-carinata, carina inferius albido-maculata, facie superne puncto albido, postscutello subtiliter punctato; 1^o

abd. segmento margine sulfureo, ultimo acute 4-carinato, pago medio elongato, parallelo haud rugoso, apice truncato. — ♀ pedibus elongatis, tibiis posticis irregulariter serrulatis; alis ferruginescensibus. ♀ L. 15 mm.

16. *C. paleata*. — Nigra, confertim punctata; mandibulis in medio sinuatis; clypeo infere produeto, margine infero transverso, in medio compresso-tuberculato, utrinque angulato; fronte inter antennas elevato-carinato; metanoti triangulo strigato; abdominis segmentis constrictis, 1^o quadrato, pygidio punctato, supra anguste elliptico; occipite, pronoto, macula metanoti, scutello, postscutello, abdominis primi segmentis marginibus, tertique limbo late, citrinis; pedum spinis brevibus albidis; calcaribus tarsisque rufescentibus; tibiis posticis supra carinatis, 4-dentatis; alis ferruginescensibus. ♀ L. 13 mm.

17. *C. perfida*. — Nigra, confertim punctata; fronte inter antennas carina superne in spinam producta; capite rufo, nigro-vario; antennis obscure rufis; clypeo ovato, impresso, inferius arcuatim carinato-marginato ac dentato; margine apicali trilobato; metanoti trigono basali strigato; abdominis segmentis 1^o—3^o anguste flavo-limbatis, 5^o, 6^o rufescentibus; pygidio elliptico, circumcircum marginato, obsolete punctato; tarsis rufescentibus; alis subhyalinis, venis ferrugineis, apice nubeculo griseo. ♀ L. 12,5 mm.

18. *C. spinifrons*. — Nigra, punctulata; capite et antennis rufis, nigro-variis; fronte inter antennas compresso-carinata, superne in dentem trigonalem producta; facie subdepressa; clypeo carinam in forma litteris U, infere tuberculata gerente, margine infero produeto, utrinque angulato, a lobis lateralibus per incisuram se juncto; postscutello laeviusculo, metanoti trigono strigato, rite delineato; abdominis segmentis 1^o—3^o sulfureo-limbatis; 5^o, 6^o rufescentibus, pygidio elliptico, subconvexo, laeviusculo, carinato-marginato; pedibus brevioribus; tibiis posticis distinete serratis; alis hyalino-ferrugineis. — L. 13 mm.

Pompilidae.

Genus *Salius*.

1. *S. militaris*. — Gracilis, deplanatus, violaceus, laevis, sericans; capite aurantio, brevi, discoidali; occipite acuto; macula verticis, ore antennisque nigris; thorace elongato, parallelippedo, pronoto quam mesonotum longiore, humeris longe aurantiis, margine postico transverso, trisinuato; mesonoto transverso, scutello fere quadrato-planato; metathorace deplanato,

late exciso, angulo utrinque trigonali-producto; abdomine basi deplanato; pedibus nigris; femoribus crassiusculis; tibiis et tarsis brevissime et rare spinulosis; alis nigro-violaceis. ♀ L. 15 mm.

2. *S. collaris*. — Niger, laevigatus, sericans; capite et proto-aurantiis; ore antennisque nigris; pronoto quam mesonotum breviore, postice areuatim sinuato; mesonoto antice rufo-bimaculato, medio carinulato; scutello prominulo, utrinque compresso, supra planato, elongato, angusto; metathorace quam longiore latiore, postice obtusangulatim exciso, angulis valde prominulatis, hebetatis; abdomen ovato-conico, haud deplanato; pedibus longiusculis, tibiis tarsisque valde spinosis, his subtus serie spinularum pectinatis; alis nigro-violaceis. ♀ L. 17 mm.

3. *S. Elliotti*. — Niger, gracilis, cinereo-sericans; antennis subtus ferrugineis, ♂ nodosis; occipite vix acute compresso; pronoto postice subangulatim inciso, utrinque excavato; metanoto parum exciso, postice argenteo-tomentoso, canthis lateralis compresso-prominulatis; abdomine subprismatico, plumbeo-cinereo, segmentis margine latiuscule nudo; tibiis et tarsis rufescentibus, tibiis et tarsis griseo-rufis, remote spinosis; alis nebulosis, apice fusco-limbatis; in alis post. vena anali ultra originem venae cubitalis exserta. ♂

4. *S. petiolaris*. — Gracilis, niger, sericans; occipite haud acute compresso, pronoto, mesonoto aequilongo postice angulatim inciso; postscutello supra elongato-trigonali, subconvexo, apice rotundato; metathorace postice parum concavo, superne margine postico obtusangulatim inciso ac marginato; abdomine cylindrico, sessili; pedibus longis, tibiis longe, metatarsis breve spinosis, matatarso antico extus spinis brevibus 3; femoribus posticis rufis, basi et apice nigris, supra ad apicem spinulis 4 minimis nigris; unguibus furcatis, ramo infero arcuato, truncato; ultimo articulo tarsorum verticillo apicali pilorum nigrorum; alis infuscatis, venis nigris, limbo apicali fusco, 3^a ar. cubitali rotundato-trigonali, petiolata; in alis post. vena anali cum v. cubitali continua. ♀ L. 13. mm.

Genus *Homonotus* Dahlb.

5. *H. nuculipes*. — Gracilis, niger, laevigatus, cinereo-sericans; antennis nigris, ♂ nodosis; vertice rotundato compresso, ocellis posticis superis; metathorace truncato; abdomine sessili, subprismatico, plumbeato, segmentis margine sat lato, nudo, nigro; pedibus basi nigris, tibiis, calcaribus, genibus anticis, femoribusque 2^o et 3^o dimidia perte apicali, rufo-griseis, spinis nigris; tarsis rufo-cinereis, articulis apice rufo-fuscis; unguibus apice furcatis; alis ferrugineis limbo apicali fusco; ar.

radiali sat lata ac brevi, acuta; ar. cubitalibus 2^a et 3^a aequae altis ac latis, 3^a anterius valde coaretata, binis venam recurrentem ultra medium excipientibus. ♂ L. 11 mm.

6. **H. ibex.** — Gracilis, niger, praecedenti simillimus abdome subprismatico, plumbeato, segmentis margine nigro; pedibus nigris, remote spinosis; femoribus posticis rufis basi et apice nigris, spinulis 2 subapicalibus nigris, calcaribus tibiarum longissimis; alis subhyalinis, limbo apicali fuso; 2^a ar. cubitali breviter petiolata. ♂ L. 9 mm.

Genus *Agenia*, Dahlb.

A. *Tarsis anticis extus haud spinoso-pectinatis.*

1. **A. vittipennis.** — Minuta, nigra, sericans; fronte elato; scutello transverso; antennis brevioribus; metanoto haud striato; abdominis segmentis basi, cinereo-plumbeo-sericantibus; tibiis tarsisque anticis inermibus; tibiis posticis, parce spinulosis; alis hyalinis, fasciis 2 transversis nigris; alarum areola cubitali 2^a trapezina, vix latiore quam altiore; 3^a minore, subquadrata, aequae lata ac alta. ♀ L. 8 mm.

2. **A. subsessilis.** — Nigra; antennarum apice subtus rufo; capite antice argenteo-piloso; metanoto rotundato, deplanatusculo, transverse confertim strigato; abdome subsessili, breviter fusiformi, rufo; pedibus rufis, brevissime spinulosis; coxis nigris; alis fuso-violaceis. ♀ L. 17 mm.

3. **A. macula.** — Nigra, antennis et pedibus nigris, metanoto convexo, obsolete striolato; abdome rufo, secundo segmento basi maeula dupliei nigra; pedibus vix spinulosis; alis fuso-violaceentibus; areola radiali semielliptica, acuta; 2^a et 3^a ar. cubitalibus latioribus quam altioribus, venas recurrentes fere in medio margine excipientibus; in alis posticis vena anali cum vena cubitali continua. ♂ L. 15. mm.

4. **A. bivittata.** — Parva, nigra, cinereo-serieans; ore, elyperi margine antennarumque apice, ferrugineis; pronoto postice sinuato; scutello haud prominulo, postscutello transverse quadrato; metathorace rotundato, haud strigato; abdome fusiformi, petiolato, primo segmento tertia parte antica petiolari dehinc infundibuliformi, convexo; pedibus longiusculis, gracilibus; anticis, calcaribus tarsisque rufescientibus; unguibus ante apicem dentatis; alis hyalinis vittis 2 nigris; areolis cubitalibus 2^a, 3^a latioribus quam altioribus, 2^a primam v. recurr. in medio, 3^a magna secundam v. rec. in tertia parte marginis excidente; in alis posticis v. analis ante originem venae cubitalis exserta. ♀ L. 9. mm.

B. Tarsis anticis extus spinis longioribus pectinatis.

5. **A. marginipennis.** — Nigra antennis, tibiis et tarsis ferrugineis; capite et thorace rufescentibus; alis aurantio-ferrugineis, limbo apicali nigro; tibiis omnibus spinosis, tibiis tarsisque anticis extus spinoso-peetinatis, tarsis omnibus margine infero serrato-scabro, velutino. L. 17—24 mm.

6. **A. apicalis.** — Nigra, velutina; antennis, tibiis et tarsis aurantiis alis rufo-ferrugineis, margine apicali nigro-limbato; tibiis anticis haud vel vix spinosis, tarso extus haud pectinato; metathorace haud strigato, convexiusculo; alis ferrugineis limbo apicali nigro, 3^a areola cubitali quam 2^a majore. ♂ L. 16 mm.

7. **A.? vidua.** — Nigro-velutina; antennis, tibiis tarsisque aurantiis; alis ferrugineis margine apicali nigro; tibiis et tarsis breviter spinulosis; alis ferrugineis, limbo apicali nigro; area cubitali 2^a lata, parum alta, primam venam recurrentem ad tertiam partem apicalem excipiente. ♂ L. 14 mm.

Genus **Pompilus** Dahlb.

1. **P. pamelas.** — Totus ater, vix cinereo-serieans; metanoto oblique rotundato, haud truncale, laevigato; abdomine subfusiformi, segmentis basi cinereo-sericantibus; pedibus breviter spinosis, anticis haud pectinatis; alis infuscatis; 2^a areola cubitali tertiae minor, 2^m venam recurrentem ante apicem excipiente. ♀ L. 10 mm.

2. **P. betsilei.** — Niger, cinereo-serieans; abdomine rufo, cinereo-sericeo, marginibus segmentorum rufis, nudis; metanoto laevigato, per sulcum partito, postice excavato; alis nebulosis, apice fuso-limbatis; areolis cubitalibus 2^a, 3^a subaequalibus. ♀. L. 10 mm.

3. **P. fallax.** — Niger, cinereo-subserieans; thorace in medio subconstricto; metathorace truncato-rotundato, laeviusculo, haud strigato; abdomine sessili segmentis 1°, 2° et tertio basi rufo-ferrugineis; tarsis anticis extus serie spinarum brevium armatis; alis infuscatis, margine apicali obscuriore; areola 2^a cubitali rhomboidaliter tertiae aequa lata, hac subtriangulari. ♀ L. 12 mm.

4. **P. lutarius.** — Gracilis, ferrugineus, cinereo-serieans; thorace elongato; mesothorace subtus, metathorace toto, nigris hoc omnino striolato, per sulcum diviso, posterius rotundato; pedibus parce spinosis, tibiis anticis extus pectinato-spinosis, alis infuscatis, 3^a areola cubitali minore, 2^a trapezina, venam recurrentem ultra medium excipiente. ♀ L. 16 mm.

5. **P. cadmios.** — Niger, impunctatus, omnino cinereo-plumbeo sericans; clypeo brevi, transverso; pronoto utrinque subangulato, postice angulatim exciso; mesonoto bisulcato; scutello compresso; postscutello bimamillari; metanoto rotundato, laevi, nec truncato, nec strigato; abdomine fusiformi; segmentis cinereo-argenteo-limbatis; tibiarum calcaribus testaceis, posticis longissimis; alis hyalino-nebulosis, anticis apice fuscis, areola 3^a cubitali minuta, venis recurrentibus in medio margine areolarum exceptis. ♀ L. 12—16 mm.

6. **P. plebeius.** — Totus rufo-ferrugineus; metanoto laevigato, haud strigato; tibiis et tarsis anticis extus serie spinarum sat brevium armatis; intermediis et posticis multiseriatim sat longe spinosis; abdomine nigrescente, 1^o segmento rufo margine anguste nigro, 2^o basi rufescente; alis aurantio-ferrugineis; areola radiali semi-elliptica, acuta; areolis cubitalibus 2^a et 3^a trapezinis, paulo latioribus quam altioribus, 2^a tertiae paulo minore, primam venam recurrentem ad apicem excipiente; in alis posticis v. anali cum vena cubitali continua. ♀ L. 15 mm.

Genus **Priocnemis** Dahlb.

1. **P. crenatipes.** — Validus, niger, nigro-velutinus setosusque; antennis aurantiis, scapo superne nigro; thorace parallelo, subconvexo; metanoto postice rotundato-truncato, basi bituberculato; scutello nitido; abdomine fusiformi; pedibus nigris, tarsis rufescentibus; tibiis tarsisque breviter spinosis; tibiis posticis superne late crenatis; unguiculis acute dentatis; alis obscuris fusco-ferrugineis, violascentibus, margine apicali nigro-violaceo. ♀ L. 32 mm.

2. **P. serripes.** — Niger, nigro-hirtus; clypeo transverso; antennis tibiis et tarsis aurantiis; metathorace convexo, striato; ano rufo-piloso; tibiis et tarsis dense spinulosis; tibiis posticis superne serratis, anticis superne muticis; alis aurantiis basi et margine apicali nigro. ♀ L. 20 mm.

3. **P. subpetiolatus.** — Ater, punctulatus, longe nigrotomentosus; antennis aurantiis, primo articulo superne nigro; thorace elongato, scutello planulo, metanoto longiusculo, rotundato, strigato, longe piloso; abdomine glauco-sericante, primo segmento convexo-infundibuliformi, longiusculo; pedipus nigris, tarsis ferrugineis; alis nigro-violaceis, ante apicem macula maiore ferruginescente obsoleta. ♀ L. 22 m.

4. **P. similipictus.** — Niger, nigro-pilosus et velutinus; mandibulis et ore ferrugineis; antennis, genibus, tibiis, tarsis et alis rufo-aurantiis, his apice nigro-limbatis; ano rufescente; metanoto rotundato, punctulato, haud strigato, utrinque cantho

rotundato ad angulos distineto, superne obsoletissime bicanaliculato, in medio per nullum sulcum diviso; tibiis submuticis, posticis supra carinatis, carina subtiliter crenulata, haud acute denticulata; alarum areola 2^a cubitali elongata, primam venam recurrentem prope apicem excipiente. ♀ L. 16 mm.

5. **P. imitans.** — Niger, nigro-pilosus et velutinus; antennis, tibiis, tarsis et alis aurantiis, his apice nigro-limbatis; metanoto rotundato-bituberculato, sulco partito, transverse rugato-strigato, superne subbicanaliculato; tibiis posticis ♀ serie tuberculorum dentiformium armatis, ♂ minute bruneo-spinulosis; alarum areola 2^a cubitali elongata, primam venam recurrentem fere ad eius apicem excipiente. ♀♂ L. 18—23 mm.

6. **P. furunculatus.** — Niger, antennis, genibus tibiis tarsisque aurantiis; postscutello compresso, metanoto strigato utrinque valde tuberculato; alis rufo-aurantiis nigro-limbatis; areola radiali valde obtusa, 2^a cubitali valde elongata, primam venam recurrentem fere ad apicem excipiente. ♂ L. 17 mm.

7. **P. hova.** — Niger, nigro-pilosus, mandibulis nigris apice rufis; antennis tibiis et tarsis ferrugineis, his apice nigris; alis aurantiis, margine apicali nigro; thorace comppresso, scutellis prominulis; metanoto punctulato, rotundato; tibiis breviter spinulosis: tibialis posticis longis, primo articulo sequentibus aequilongo; tibiarum calcare interno dimidum metatarsum aequante; alarum 2^a areola cubitali parum elongata tertiae aequilonga, primam venam recurrentem in tertia parte apicali excipiente. ♂ L. 13 mm.

8. **P. Hildebrandti.** — Niger, nigro-pilosus; capite rufescente, ore rufo; antennis, tibiis et tarsis ferrugineis; alis ferrugineis, subinfuscatis apice haud marginatis; metanoto rotundato, confertim punctulato, haud strigato; tibiis posticis supra serie dentium 8—10 trigonalium armatis, spinis nigris intermixtis, intus sulcatis et carinatis; tarsis gracilibus, longissimis, primo articulis sequentibus 3 longiore; 4^o quam tertius duplo breviore, calcaribus tibiarum longissimis, gracillimis; alarum 2^a ar. cubitali longiseula, primam recurrentem ad 5^{am} partem apicalem marginis excipiente. ♀ L. 15 mm.

9. **P. venustipennis.** — Aterrimus, laevis; ocellis invicem valde propinquis; thorace elongato, gracilli, compresso; pronoto posterius angulatim inciso; metathorace rotundato, nec strigato nec punctato; abdomine polito, quam pronotum latiore, fusiformi, ano rufo-piloso; pedibus gracilibus, brevissime spinulosis; tibiis posticis serratis, alis ferrugineis, fusco-fasciatis, apice anguste fusco-limbatis. ♀ L. 15 mm.

Genus **Cyphononyx**, Dahlb.

Cyphononyx (Schistonyx*) decorata. — Gracilis, capite, thorace, antennis pedibusque rufis, abdomine nigro, pronoti, metatoracis abdominisque primi segmenti margine postico sulfureo; scutello trigonali-prominulo; metanoto velutino; adomine sessile, basi depressiuseculo, primo segmento infundibuliformi, basi latiusculo, haud acuminato; tibiis et metatarsis remote-, antieis brevissime spinosis, unguibus furcatis; alis ferrugineis apice fusco-limbatis; areolis cubitalibus 2^a, 3^a fere aequae grandibus, 2^a ad angulum apicalem posticum oblique producta, primam venam recurrentem prope apicem excipiente; in alis posticis, v. anali longe ultra venam cubitalem in v. discoidali exserta. — ♂ Antennis crassis, subtus planulis, superne undatis, inter articulos constrictis. L. 12—16 mm.

Genus **Mygnimia**, Smith.

1. **Bidens.** — Nigro-velutina, nigro-pilosa; autennis ferrugineis; capite obscurae-ferrugineo; metanoio truncato, strigato, superne transverse quadrato, utrinque dentato, tibiis, genubus et tarsis ferrugineis; tibiis intermedius et posticis superne valde spinosis, alis nigro-violaceis; posticarum vena cubitalis rectangulatim fracta. ♀. L. 30—33 m.

2. **M. bidentata.** — Nigro-velutina; nigro-pilosa; capite anterius rufido; postscutello compresso-tuberculato; metanoto elongato, tantum apice truncale, strigato, utrinque ante apicem tuberculo valido instrueto; tibiis et tarsis ferrugineis, subtiliter spinulosis; alis nigro-violaceis; posticarum vena cubitalis basi valde recurva. ♂ L. 29 mm.

3. **M. hova.** — Nigro-velutina; antennis, tibiis tarsisque aurantiis; methatorace strigato, basi transverse canaliculato, posterius in medio haud strigato, utrinque cantho acuto arcuato marginato; abdomine ovato-conico, sessili; tibiis muticis, valde pilosis, posticis superne carinulato-crenatis intermedio superne seribus 2 spinulorum instructo, alis aurantiis, margine apicali latiuscula basique brevissime nigris; posticarum vena anali ultra originem venae cubitalis exserta. ♀ L. 17—23 mm.

4. **M. nenitra.** — Rufo-ferruginea; abdomine sessili, nigro, apice rufo; alis nigro-coeruleis; postscutello subcarinato; metanoto obsolete tenuiter strigato, truncato, utrinque pone stigmata oblique sulcato, sulco subbasali transverso, profundo; tibiis posticis superne carina serrulata instructis biseriatisque spinulosis; ungnibus bidentatis. ♀ L. 23 mm.

* Saussure, Societas entomologica, II., 1887, p. 3

5. **M. coeruleopennis.** — Nigra, gracilior, antennis, capite, pronoto, mesonoto, scutellis, pedibus, abdominisque ultimis segmentis 2 aurantiis, vel fulvo-rufis, aurulento-sericantibus; clypei margine infero transverso, subflexo; metathorace truncato, transverse distincte strigato; tibiis posticis superne carinatis, in carinula serratis extusque biseriatim spinulosis; alis nigro-coeruleis. ♀ L. 22 mm. (India).

6. **M. aeneipennis.** — Nigra vel fusca; antennis, capite, pronoto, mesonoto, scutello, tegulis, pedibus abdominisque segmentis 3^o—6^o aurantiis, aureo-tomentosis; postscutello pleurisque fulvo-fuscescentibus; alis nigro-coeruleis; tibiis posticis ut in *Myg. nenitra* spinosis. ♀ L. 22 mm. (Guinea).

Eine lepidopterologische Notiz.

Von Heinr. Knecht in Basel.

(Ein neuer Schweizerbürger.)

Dieser Tage fand ich beim Aufweichen der letzten Sommerausbeute einen, von meinem Sohn Andreas am 9. August bei Leuk gefangenen, sonderbaren *Spilothyrous*. Dieser Falter stimmt ganz genau mit 2 im hiesigen Museum befindlichen Exemplaren von *Spil. Altheae* var. *Baeticus* Rbr. aus der Gerber'schen Sammlung, wahrscheinlich Staudinger'schen Stücken.

Ich traf im Jahr 1888 bei Inden den typischen *Altheae* in Anzahl, ohne Spur einer Abänderung. Die diesjährige interessante Varietät *Baeticus* stammt von der heissen, mittäglichen Halde bei Leuk Stadt.

Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer.

Von Dr. Stierlin.

Ot. *argentifer*.

Oblongus, niger, squamulis rotundatis argenteis variegatus et sat dense vestitus, rostro capite dimidio longiore, sulcato, scrobe ad oculos pertingente, antennis gracilibus funiculi articulo secundo primo triplo longiore, externis oboconicis, latitudine longioribus, thorace longitudine paulo latiori, lateribus rotundato, granulato; elytris latitudine triplo longioribus punctato-striatis, interstitiis seriatim granulatis, femoribus muticis. Long 10 mm. Graccia von Hrn. Emge gesendet.